

た

ダーウィン《人名》: Charles Robert Darwin, 生物学者、進化論を唱える。「種の起源」、「人間の由来」などの著者,
ターゲティング療法《外科》: targeting therapy,
ターナー症候群: Turner's syndrome. ターナーの歯: Turner's tooth,
タービン: turbine, high speed air turbine,
ターミナルケア: terminal care,
ダール《人名》: Dahi, G.S.A., 世界で初めてインプラントの学術論文発表、1943年、ダイ、鋳型、金型、石膏型: die, (the *d.* should exhibit the minute details of the impression), (the *d.* must be strong and resist abrasion), 着脱性のダイ: removable *d.*,
体位: posture,
第一線、中心、最前線: the forefront, (the forefront of periodontal infection),
体位: posture,
退院する: discharge from the hospital,
大陰唇: labium majus, (複) labia majora,
体液: fluid, body fluid, (形) 体液の: humoral, (*h.* pathways), (*h.* immunity), 唾液機能検査: saliva examination, 唾液小体: salivary corpuscle, (形) 体液性の: humoral, (*h.* pathway), 体液流の停止、血流停止、蠕動運動減少: stasis,
ダイエット: diet, (generally, low-fat, low-protein *d.* can ease pain from rheumatoid arthritis),
ダイオドラスト《検査》: diodrast,
ダイオードレーザー: diode laser,

体温: temperature, 体温が上がる(下がる): temperature rose (fell), 体温計: clinical thermometer, 直腸体温計: rectal thermometer, 口腔体温計: oral thermometer, 体温を測る: take someone's temperature, (my *t.* was taken), 基礎体温: basal body *t.*,
退化(生物)、分解(化学)、劣化: degradation, degeneration, (the organ has degenerated because of disuse),
対角線: diagonal,
対顎: opposing jaw, opposing arch, 対顎関係: iaw to jaw relationships, jaw rations,
対角線、(面) 斜め: diagonal,
大学病院: university hospital, (大学病院に紹介状をお書き致しましょう。I will write a letter of introduction to the university hospital).
耐火模型: refractory cast,
代替機器: alternate device,
大臼歯: molar, 第一大臼歯: first molar, 第二大臼歯: second molar,
体幹: trunk,
大儀な、ものうげな、(疲れて) 元気がない: listless,
耐久性: durability, (*d.* of the resin cement), endurance, consistency, (final restoration in color and *c.*), 耐久力のある: durable, (more *d.* high-tech materials),
大胸筋: pectoral major (muscle),
ダイクロン《薬》: Dyclone, (dyclonin hydrochloride),
体型: habitus, (body *h.* : marked obesity or wasting suggests the possibility of hormonal or nutritional disturbances such

as malignancy or tuberculosis),
 台形: trapezoid, ~の: trapezoidal (*t. flap*),
 (*t. incision*),
 退形成(腫瘍細胞などの対して)《病理》:
 anaplasia, (anaplasia of the malignant
 cells), (形) anaplastic, (*a. in their*
microscopic characteristic),
 退行、退縮: regression, recession, (形) 退
 行の: recessive, (*autosomnal recessive*
gene), (*r. of gingiva*), 退行性変化:
 regressive change, degenerative change,
 退行性疾患: degenerative disease,
 対合: opposing, 対合歯: antagonist,
 opposing teeth, opposing teeth,
 opponent, 対顎: opposing jaw, 対合咬頭:
 opposing cusp, 対合側: opposing side, 対
 合する: oppose, (*each tooth is opposed to*
teeth),
 大口蓋管: greater palatine canal,
 大口蓋孔: greater palatine foramen,
 大口蓋神経: greater palatine nerve,
 大口蓋動脈: greater palatine artery,
 對抗効果(義歯の): reciprocation,
 大口症: macrostomia,
 退行性の: degenerative, 退行性変化:
 degenerative change, regressive
 alteration, 退行変性, 変性、変質:
 degeneration,
 大後頭神経: greater occipital nerve,
 ダイコム、DICOM: digital imaging and
 communication in medicine,
 体細胞: somatic cells,
 第三期の: tertiary, (*the t. syphilis*),
 大惨事: catastrophe,
 胎児: (3 ヶ月未満) embryo, (3 ヶ月以後) ;

fetus, 胎児の: embryonic, fetal,
 embryonal, (*e. tissues*), 発生学:
 embryology, 胎児の、胚芽の: embryonic,
 (*e. cell*), (*e. vulnerability to cleft*
production), 胎児期: fetal phase,

第四大臼歯(知歯の遠心に萌出): distomolar,

体質、(病気などになりやすい) 傾向:
 predisposition, (*he has a p. for heart*
disease), 体質、気質、体格、健康、免疫:
 constitution, (*allergic c.*), 体質、性質、気
 質、健康、体格: constitution,

代謝: metabolism, (形) metabolic, 基礎代謝:
 basal metabolism. 代謝障害:
 decompensation, 代謝産物: metabolite,
 metabolic products, 代謝性症候群、メタ
 ボリックシンドローム、メタボ: metabolic
 syndrome,

体重: weight, 体重過剰: overweight, 体重過
 少: underweight, 標準体重: ideal body
 weight, 基礎代謝: basal metabolism, 《会
 話》意図しないでかなりの体重が減ってい
 ないですか: *Do you have a significant*
unintentional weight loss?,

退縮, 後退: retraction, (*lingual r.*),
 recession, (*gingival r.*), involution, (*i. of*
uterus), recede, (*receding gums*),

体循環: systemic circulation,

代償: compensation,

対象患者: candidate, (*financial*
consideration can make someone a less-
than-ideal implants c.),

対照群: control group, ~とは対照的に: as
 opposed to, (*direct measurements of*
opposed to proportional measurement),

対照実験: control experiment,

対称性 (左右) : symmetry, (facial *s.*), (形) symmetrical, symmetric, ⇔ asymmetry,
 代償性の : vicarious, (*v.* bleeding),
 代償野 : compensatory, 代償成長 : *c.* growth,
 代償障害 (心臓の機能上の欠陥を補いきれなくなつて生ずる呼吸困難など) : decompensation,
 代償の : compensatory, (*c.* activity),
 対症療法 : symptomatic treatment,
 帯状疱疹、帯状ヘルペス : herpes zoster, singles, shingles, zona,
 大静脈 : vena cava, (形) vena caval,
 代食細胞、マクロファージ : macrophage,
 大食症、過食症 : bulimia,
 耐蝕性 : corrosion resistance,
 大唇 (症)、巨大唇 : macrocheilia, macrolabia,
 耐性 : tplerance, ~菌 : resistant bacteria, resistant organisms, 薬物耐性 : tolerance of drug,
 胎生学 : embryology,
 胎生期遺物、痕跡的残留部 : vestige,
 代生歯 : succedaneous teeth,
 体性の : somatic, 体性感覚 : somato-sensor,
 退生の : anaplastic, (*a.* fibroblasts appears),
 大舌症 : macroglossia,
 苔癬《皮膚科、外科》 : lichen, (形) 苔癬様の : lichenoid, (*l.* type of desquamative gingivitis),
 体操 : exercise, gymnastics, 柔軟体操 : limbering movement, 顔の体操 : facial gymnastics,
 対側性の、反対側に起きる : contralateral,
 タイター量 : titer, (a high antibody *t.*),
 大腿部 : (医) femur, (一般) thigh, (形) femoral,
 大腿骨 : (医) femur, (一般) thighbone,

大腿四頭筋 : quadriceps,
 大腿二頭筋 : biceps femoris,
 大腿動脈 : femoral artery,
 大腸 : large intestine, colon, 上行結腸 : ascending colon, 横行結腸 : transverse colon, 下向結腸 : descending colon,
 大腸炎 : colitis, 潰瘍性大腸炎 : ulcerative cplitis,
 大腸菌 : eschetichia coli,
 大臀筋 : gluteus maximus,
 大動脈 : aorta, 大動脈弓 : arch of aorta, 上行大動脈 : ascending aorta,
 体内毒素、エンドトキシン : endotoxin,
 体内時計 : circadian clock,
 ダイナミックインプレッション《補綴》 : dynamic impression,
 第二象牙質 : secondary dentin,
 大脳 : cerebrum, (複) ~bra, (形) cerebral, 大脳皮質 : cerebrum cortex, 大脳半球 : cerabral hemisphere,
 大発見、大成功 : breakthrough,
 胎盤 : placenta, 胎盤の : placental,
 対比 : contradistinction, (the finding is in *c.* to all other reported studies),
代表的な : reprresentative, (代表的な病理モデル : *r.* pathologic models),
対物レンズ : objective lens,
 大便 : feces, (形) fecal,
 大傍脊椎筋 : larger paraspinal muscles,
 タイポドント (咬合器) : typodont,
 ダイヤモンド : diamond, ダイヤモンドポイント : diamond point, diamond stone, ダイヤモンドディスク : diamond disk, ファイングリットダイヤモンドインスツルメント : fine-grit diamond instrument,

太陽神経叢：solar plexus,

代用する：substitute, (there is no s. for casts of the natural dentition), 代用品：substitute, substitute material, 代用骨：bone substitute, substitutive bone, synthetic bone, 骨代用物質：bone-substitute material, (欠損した組織の代わりに金属や無機物を)代用すること：entnesis, (formation arising from e. of the vertebral bodies),

平らにする：flush with ~, (the root is remodeled, so as to be f.w. bony ridge), (凸凹しているところや、しわが出来ているところを)平らにのぼす：flatten out, 平らな：depressed, (d. lesion),

ダイランチン (デフェニールヒダントイン：diphenylhydantoin)：Dilantin, 歯肉増殖症：gingival phyperplasia due to Dilantin, gingival enlargement associated with Dilantin therapy, Dilantin gingival hyperplasia, ダイランチン療法：Dilantin therapy,

大理石骨病：osteopetrosis, marble bone disease, marble bones,

大隆線核：raphe magnus nucleus,

タイルノール《薬》：Tylenol, (Take two T. within 2 hours to minimize this discomfort),

大連結子《補綴》：majo(u)r connector,

ダイロック・トレイ：Di-Lok tray,

多因性の：multifactorial,

ダウエルピン《補綴》：dowel pin, (d.p. is luted in position), (removable dies with d.p.),

タウン投影《放射》：Towne's projection, (T.p.

for the condyles),

ダウングロース、(歯周ポケット上皮の下方発育)：downgrowth,

ダウン症候群：Down's syndrome, Mongolis,

唾液：saliva, (the oral cavity is bathed with s. at the rate of 1000 to 1500 cc/day), (動)

唾液が出る：salivate, (口から唾液が多量に流れ出る：Saliva flows out abundantly from the mouth), ~を吐き出す：expectorate, ねばねばの～：ropy saliva,

唾液の：sialotic, ~分泌：salivation, salivary secretion, ~過多：sialosis, salivation, 粘着性の～：ropy saliva, ~欠乏症：sialaporia. ~管：salivary duct, ~分泌：salivation, ptyalism, ~ (食物を)

咬んで唾液を混ぜる：insalivate, ~分泌促進剤：sialagogue, sialogogue, (the use of s. to increase the salivary flow), ⇔ antisialogogue, 唾液小体：salivary corpuscles, 唾液アミラーゼ：salivary amylase, ~瘻：salivary fistula, 流唾症、異常唾液分泌過多：sialorrhea, excessive salivation, 無唾液症：aptyalism,

唾液管X線写真：sialogram, 唾液管狭窄：sialostenosis, 唾液腺管：salivary duct, 唾液管X線写真：sialogram, 唾液管X線写真撮影術：sialography, 唾液管炎：sialoductitis, 唾液小丘：caruncula salivaris,

唾液腺：salivary gland, 小～：minor

salivary gland, (salivary glands are

divided into major and minor glands), 大

～major salivary gland, 唾液状の：sialotic,

無唾液：aptyalism,

無唾液：aptyalism,

無唾液：aptyalism,

無唾液：aptyalism,

唾液腺炎 : sialadenitis,
 唾液腺管拡張症 : sialiectasis,
 唾液腺管 : salivary duct,
 唾液腺管炎 : sialodochitis,
 唾液腺腫 : salivary adenoma,
 唾液腺切開術 : sialithotomy,
 唾液腺造影法 : sialography, 〜シンチグラフィ
 ー : salivary scintigraphy,
 : sialography, 唾液腺造影写真 : sialogram,
 (it is observed in the s.),
 唾液腺嚢胞 : sialoceles,
 唾液分泌過多 : sialosis, sialorrhea, ptyalism,
 ptyalism,
 唾液分泌減退症 : hyposalivation,
 唾液分泌障害 : hypoptyalism,
 唾液分泌抑制 : sialoschesis,
 絶え間ない : incessant, (i. involuntary
 closing of her eyes), (i. annoying grinding
 and popping noises in her joint) ,
 unremitting, (u. burning pain),
 楕円 : ellipse, (the lesion is outlined with an
 e. incision), 楕円形の : elliptical,
 絶えられる : amenable, (scar bands are a. to
 the procedure), (it is a. to treatment with
 mild analgesics), 耐えられない :
 unendurable, (muscle spasm is u.),
 倒す、寝せる : recline, 《会話》椅子を倒しま
 す : I am going to have you recline.)
 多核巨細胞 : multinucleated giant cell,
 多核細胞 : multinuclear cell,
 他覚症状 : objective symptom,
 多角形 : polygon, 多角形の : polygonal (p.
 epithelial cells),
 タガート《人名》 : William H. Taggart, (1855
 —1933), インレーの術式を飛躍的に進歩さ

せた。

他家の : allogenic, (a. bone graft),
 他家骨移植 : allograft, xenograft, 他家移植材
 料 : allogenic bone graft,
 高める、(価値、審美、精度などを) 増す :
 enhance, (e. retention),
 多関節の : polyarthric,
 多汗 : hyperhidrosis,
 多機能 : multifunction, (形) multifunctional,
 妥協する : compromise, (a c. be made
 between restoring tooth surfaces),
 多形核の : polymorphonuclear, (p.
 leukocytes),
 多形核白血球、polymorphonuclear
 leukocytes (PMNs),
 多形紅斑 : erythema multiforme,
 多形腺腫 : pleomorphic adenoma,
 多形態 : pleomorphism, (cell and tissue p.),
 (cellular and nuclear p.),
 多血症 : polycythemia,
 多血小板血漿 : platelet rich plasma (PRP),
 多形性 : pleomorphism, (形) 多形性の : poly-
 morphic, polymorphous, 多形性腺腫 :
 pleomorphic adenoma, 多形細胞肉
 腫 : pleomorphic cell sarcoma, 多形性脂
 肪腫 : pleomorphic lipoma, 多形紅斑 :
 erythema multiform, 唾液様の : sialoid,
 多形性紅斑《病名》 : erythema multiform
 (MM),
 多血質な、血みどろの、血の : sanguineous,
 (s. fluid),
 多結晶 : polycrystal. 多結晶の : polycrystalline,
 多結節性の : multinodular,
 多元的、多因子性の : multifactorial,
 たこ、胼胝 (べんち) : callus,

多孔性 : porosity, (these ~ies are charactoristic for sandblasted), (形) ~の : porous, (*p.* implant), (*p.* surface), (*p.* material), multiporous, cavernous, (*c.* lymphangioma), cancellate,

蛇行性の : serpiginous,

多咬頭の : multicuspid,

多根歯 : multi-rooted tooth,

多根性の : multirooted,

多剤耐性 : multiple resistance, multiple tolerance,

多細胞性の : multicellular,

確かな : valid, (this course that is most *v.*),

確かめる : ascertain, (*a.* the pognosis), (*a.* the correct size of the tumor),

多歯性の : multidentate,

多重焦点の : multifocal, (the lesion occur in a *m.* fashion),

多重人格 : split personality,

多小葉性の : multi-locular,

多食症 : bulimia, nervosa,

打診 : percussion, ~する : percuss, ~音 : sound of percussion, percussion tone, ~痛 : percussion pain, sensitive to percussion,

出す : give off, (fibroblasts give off interacing projections),

多数~ : multi~, (多数歯の : multidentate, 多咬頭の : multicuspid, 多核の : multinucleate, 多数のバンドをかけた : multibanded, 多世代の : multifamilial, 混合感染の : multiinfected,

多数歯欠損 : multiple missing teeth,

唾石 : sialolith, salivary calculus, salivary stone, (the *s.* may be palpable by

bimanual manipulation), sialolith, (submandibular *s.*), ~形成 : sialolith formation, 唾石症 : sialolithiasis, salivalithiasis, salivary duct stone, salivary duct calculus,

たたく (打つ) : whack, (hard whacks can break the bone),

正しい : correct, 正しくない : incorrect, (*c.* and *i.* incision),

脱塩 : demineralization, 脱塩する、鉱物質を除く : demineralize, (demineralized zone),

脱灰 : decalcification, (gingival crest is the most susceptible to *d.*), demineralization, 脱灰骨 : decalcified bone, 脱灰凍結乾燥骨 : demineralized freeze-dried bone (DFDB), 脱灰切片 : decalcified section, 未脱灰 : undecalsification, 未脱灰部 : undecalcified section, (動) 脱灰する、~させる : decalcify, (decalcified in 10% ethylenediamine tetra-aacetate),

脱感作 : desensitization,

脱臼 : luxation, dislocation, (condylar head is dislocated forward out of the glenoid fossa), displacement, (traumatic *d.* of tooth from the socket), delivery, (apical and closing forces are maintained throughout the course of the extraction until *d.* is begun), ~する : luxate, (the premolar is luxated), (抜歯の時に歯を) 脱臼させる : (*I.* the tooth in the buccodistal direction), dislocation, deliver, (deliver the tooth, 脱臼歯 : luxated tooth, 亜脱臼 : subluxation, incomplete luxsation, 側方脱臼 : lateral luxation, 挺出性脱臼 : extrusive luxation,

半脱臼 : subluxation, 関節脱臼 : joint dislocation,
 脱色素 : depigmentation,
 脱脂綿 : (米) absorbent cotton, (英) cotton wool,
 脱出、脱症、下垂(症) : prolapse, (mitral valve *p.*),
 脱神経 : denervation,
 脱水(症) : dehydration, (動) dehydrate,
 W-Y プッシュバック処置《外科》: W-Y push-back procedure,
 脱髄 : demyelination,
 脱炭酸 : decarboxylation,
 タッピング、軽く叩くこと : tapping, (pussing or tapping the osteotomes into place hopefully),
 ダッペングラス、ダッペンディッシュ : dappen dish,
 脱毛症 : alopecia,
 脱抑制、脱制止、脱阻害、反応阻害物質の除去 : disinhibition,
 脱落させる : unseat, (that force would *u.* the denture), dislodge, (the force *d.* the denture), (dislodging factors of the denture-base), (名) dislodgement, (*d.* of the upper denture), **〔歯の〕脱落 : dedentition.** 脱落(乳歯の生理的な喪失) : exfoliation, (*e.* of deciduous teeth), 乳歯が自然脱落する : deciduous teeth are shed, 脱落歯(乳歯) : deciduous teeth,
 脱離(歯の) : avulsion, 脱離歯 : avulsed teeth,
 脱力 : weakness, 脱力感 : lassitude,
 縦の : longitudinal, (*l.* incision),
 タトゥー、入れ墨(いれずみ) : tattoo,
 妥当性 : relevance, (clinical *r.*), 妥当な、ま

ずまずの、満足 of いく : competent, (diazepam has proven to be a *c.* drug inrelaxing patients), 妥当な、根拠の確かな : valid, 妥当性 : adequacy, (*a.* of the tooth preparation), 妥当性 : validity,
 例えば : for example, for instance, eg, (ラテン語, e.g.(*exempli gratia.*)),
 多糖類 : polysaccharide,
 多難な、波乱に富む : eventful, 多難な、頑固な : rocky, 多難な、抑制された : checked, 多難な、困ったような、心の病を持った、問題の多い : troubled.
 多尿症 : polyuria,
 多能性の(幼弱細胞が異なった発達の可能性がある) : pluripotent, (*p.* mesenchymal cells), (*p.* effect of vitamin E), (*p.* cancer cells),
 束 ; bundle (spinal nerve bundles include herves of both motor and sensory systems),
 タバコ : (紙巻タバコ) : cigarette, 葉巻煙草 : cigar, cheroot, (パイプ用)タバコ : tobacco, (the use of *t.* is considered as an ethiological factor), 喫煙 : smoking, タバコを吸わない人 : nonsmoker, 噛みタバコ : chewing tobacco, かぎタバコ : snuff, マリファナ入りタバコ : stick, かぎタバコを吸う : snuff-dipping, snuff, 私はタバコを吸う : I smoke, 私はタバコを吸わない : I am a nonsmoker, タバコを止める ; give up smoking, (he used neither tobacco nor sake),
 多発性関節炎 : polyarthritis,
多発性原発腫瘍 :
 多発性硬化症 : multiple sclerosis,

disseminated sclerosis,
 多発性骨髄腫 : multiple myeloma,
 多発性嚢胞 : multilocular cyst,
 タフト (歯ブラシの毛束)、毛細血管叢 : tuft,
 (one-tuft-brush, multi-tuft-brush),
 多壁性骨欠損 : multiwalled bony defect,
 多房性の、多嚢胞性の : multicystic, (*m.* tumor), multilocular,
 WHO、国際保険機構 : world health organization,
 WZ《保険用語》、歯根嚢胞 : (WZはドイツ語 Wurzelzyste の略), radicular cyst, apical cyst,
 多分化能の : pluripotential, (*p.* cell),
 食べる : eat, have, take, 食べてみる : try (food) sample, 一口食べる : have a mouthful, 《会話》わたしはせんべいを一口食べた : *I had a mouthful of a sembei (ricecracker)*, 急いで食べる : gobble up, take a hsty snack , むしゃむしゃ食べる : munch on, がつがつ食べる : engorge, ポリポリ喰う : crunch, うんと食べる : feed up, たらふく食べる : engorge, 食べられない : inability to eat, 食べさせる : feed, 《会話》わたしは子供日果物を食べさせます : *I feed my baby a fruit.*
 多房性の : multilocular, (*m.* cyst),
 打撲 (傷) : bruising, 打撲傷、擦り傷、ひつかき傷 : bruise, 打撲、精神的打撃、ショック : blow, 打撲傷、挫傷 : contusion, (*c.* is usually produced by an impact from a blunt object without breaking the skin),
 ダミー《補綴》 : dummy,
 多面体 : polyhedron, 多面体の : polyhedral,
 多目的な、多彩の : versatile, (*v.* metals),

多様性 : diversity, (histological *d.* of tumors), multiplicity, (*m.* of action), variegation, (color *v.*),
 多葉性の : multilobulated, (*m.* protuberance), multilobular, (the radiographic aspect of an ameloblastoma may be uni- or *m.* lucency),
 垂らす、抜け落ちる、剥がれる : slough, (sloughing of the flaps), 垂れ下がり : tag, (small *t.* of labial mucosa), droop, (drooping of the left upper lip),
 タルカムパウダー : talcum powder,
 ダルポント修正手術 : Dal Pont modified operation,
 ダロー液《薬、外科》 : Darrow solution,
 たわみ : flexure, flexibility, (*f.* of the denture), (形) 曲げ易い、たわみ易い : flexible, (動) 曲げる : flex,
 痰 : phlegm, sputam, 痰壺 : spitton, 去痰剤 : expectorant,
 単位 : unit (U), (1000 units dissolving in one ml. of water), (1000U/cc),
 単一形の : monomorphic, (*m.* lymphoreticular cells),
 炭化 : carbonization,
 段階的アプローチ : staged approach, 段階的な歯周治療処置、順を追った歯周治療処置 : step-by-step procedure for periodontal treatment,
 単核の : mononuclear, 単核細胞 : mononuclear cell, mononuclea, 単核食細胞系 : mononuclear phagocyte system,
 単核症、単球増加症 : mononucleosis,
 単核白血球増多症 : mononucleosis,
 短顎症 : brachygnathia,

炭化水素：hydrocarbon,
 単冠：single crown,
 胆管：bile duct,
 短顔の：brachyfacial,
 単眼用の：monocular, (*m. microscope*), ⇔
 multiocular,
 短気：irascible, quick-tempered, short-
 tempered,
 短期間作用の (薬などが)：short-acting, ⇔
 long-acting,,
 単球：monocyte (MONO), (形) monocytic,
 単球菌：monococcus,
 単球症、単球増加症：monocytosis,
 単結晶体：monocrystalline, (形) 単結晶の：
 single crystal, 単結晶サファイヤインプ
 ラント：single crystal sapphire implant,
 単球、単核白血球：monocyte, (形) monocytic,
 タングスチン塩酸：tangstate,
 タングスラスト《矯正》：tongue thrust,
 単クローン性の：monoclonal,
 単根歯：single-rooted tooth,
 探査する、探求する、検査する：explore, 探
 針：explorer,
 単細胞の：acellular, (*a. film called the*
acquired pellicle),
 単細胞動物の：protozoan,
 炭酸カルシウム：calcium carbonate,
 炭酸ナトリウム：sodium carbonate,
 単室の、単空の：unilocular, (*u. cyst*),
 胆汁：bile,
 短縮：contraction, shortening, reduction, 短
 縮した：abbreviated, (*the table is*
presented in an a. form), shortened, 短
 縮歯列：shortened dental arch,
 単純窩洞：simple cavity,

単純固定：simple anchorage,
 単純骨折：simple (bone) fracture,
 単純床：simple plate,
 単純縫合《外科》：simple suture,
 男女比：the male- female ratio, (*3:1 m. f.*
ratio),
 探針、エキスプローラー：explorer, 探針ホル
 ダー：broach holder, 豚尾～：pig tail e.,
 根分岐部～：furcation probe, 歯周～：
 periodontal probe,
 短唇症：brachycheilia,
 断髄：pulpectomy, partial pulpectomy,
 pulpotomy,
 炭水化物：carbohydrate,
 弾性、伸縮性、適応性：elasticity, 弾性、復元
 力、元氣：resilience, (*plastic r.*), (*r. of*
mucosa), (弾力+強さ)：tonicity, (*t. of*
the muscle), 硬弾性：firm elastic, (形)弾性
 のある：resilient, (*natural tooth with its r.*
periodontium), elastic, 弾性限：elastic
 limit, 歯間弾性バンド (矯正用)：
 intermaxillary elastic, 弾力のある粘膜：
 resilient mucosa, 弾性変形：deformation of
 elasticity, 弾性率、弾性係数：elastic
 modulus,
 弾性印象材：elastic impression material, (印
 象用などの) 弾性材料：elastic materials,
 端生歯 (歯が歯槽骨内に植立せず、結合組織
 によって学校つと付着する)：acrodont,
 胆石：gallstone, 胆石症：cholelithiasis,
 gallstone disease,
 短舌の：brachyglossal,
 炭素：carbon, 炭素化合物：carbon compound,
 炭素鋼：carbon steel, 炭素繊維：carbon
 fiber,

炭疽菌 : anthrax bacillus,
 断層写真 : tomograph, laninagram, layer
 radiography, 断層撮影法 : tomography,
 planigraphy, laninagraphy,
 断続的な、間欠的な : intermittent, (*i.*
 irritation), (*i.* paroxysm), (*i.* suture),
 鍛造 (たんぞう) する : forge, (名) forging,
 炭素酸アパタイト : carbonate apatite,
 炭素繊維 : carbon fiber,
 淡蒼球 《解剖》 : globus pallidus,
 炭そ病 : anthrax,
 タンタル 《材料》 : tantalum,
 痰ツボ、スピットン : (米) spitton, cuspidor,
 ユニットの痰壺 (スピットン) : the cuspidor
 on the unit,
 単糖 : monosaccharide,
 胆道 : biliary duct,
 単独の : single, sole, single, 単独のアッタチ
 メント : solitary attachment, 単独植立イ
 ンプラント : single standing implant, free-
 standing implant, (その患者さんにのみ使
 用する : single patient use only), 単独で :
 solely, (these disorders are *s.* managed by
 the dentist),
 短頭の : brachycephalic, short and broad face,
 タンニン酸 : tannic acid,
 タンネレラ・フォーシテイス 《細菌》 :
 Tannerella forsythis,
 胆嚢 : gallbladder,
 タンパク質 : protein, (*p.* is a natural
 substance found in meat, eggs, fish, etc.),
 (形) proteinaceous, proteinic, proteinous,
 異種蛋白 : foreign *p.*, 血清蛋白 : serum *p.*,
 蛋白分解 : proteolysis, (形) proteolytic, 蛋
 白質合成 : *p.* biosynthesis, 蛋白尿 : protein-

uria, 総蛋白量 : total protein,
 蛋白分解酵素 : proteolytic enzyme,
 proteinase,
 単発性の : solitary, (solitary tumor), simple,
 (*s.* bone cyst), unicameral,
 弾発音 : clicking, snapping, grating,
 断片的な、ばらばらの : fractional, (a higher
f. surface area of the cells per high- power
 field),
 単房性の、群居しない : unilocular, monocular,
 (*m.* cyst), unicystic, (*u.* lesions),
 タンポン : tampon, タンポン法、外科手術で
 のタンポン使用 : tamponade,
 単麻痺 : monoplegia,
 ダンマー 《材料》 : dammer,
 断面図 : cross section, (the figures show
 various *c. s.*), (cross-sectional CT imaging
 technique) , 断面研究 : cross sectional
 study,
 単量体 : monomer, 単量体に分解する(重合体
 が) : depolymerize,
 弾力 : resiliency, elasticity, (形) 弾力のある :
 elastic, (*e.* band), (*e.* straps), (*e.*
 tension), resilient (the tissue is firm
 and *r.*), spring, (plastic coping can *s.* and
 change shape), (*s.*),
 弾力床 : spring plate,
 弾力包帯 : Barton bandage,
 断裂、破裂 : rupture, (*r.* of blood vessels),

ち

チアノーゼ 《外科》 : (チアノーゼ Zyanose は
 ドイツ語), cyanosis, (形) cyanotic,

チアミン《生化》: thiamine, aneurin,
Vitamin B,

チアリ奇形: Chiari malformation,

TGF- β (トランスフォーミング成長因子 β :
transforming growth factor- β ,

TMD、顎関節症: temporomandibular
disorder (disturbance),

チーズ様の: cheese appearance, caseous,

チールシュ植皮術: Thiersh skin graft,

チール・ネルゼン染色《病理、組織》: Ziel-
Neelsen stain,

遅延: retardation, (mental and physical *r.*),
(*r.* of eruption of teeth), 遅延型インプラ

ント: delayed (placed) implant, 遅延荷重
《インプラント》: delayed loading, (石膏、

印象材、レジンなどの) 遅延剤: retarder,
遅延反射: delayed reflex,

チオグリコール酸《生化》: thioglycollic acid,
チオグリコール酸培地: thioglycollate
medium,

チオペンタルナトリウム: thiopental sodium,

知覚、認知: perception,

知覚、感覚: sensory, 知覚異常: paresthesia,
知覚適応: sensory adaptation, 知覚障害:
sensory disturbance, 骨性知覚:
osseoperception, (形) 知覚の: perceptual,
(*p.* disturbances),

知覚異常, 知覚低下: paresthesia, dysesthesia,

知覚核複合体: sensory nuclear complex,

知覚過敏、過敏性: hypersensitivity, 象牙質

知覚過敏: hypersensitive dentin, 歯牙知
覚過敏症: hemodia, 過敏症、過緊張、過度

の興奮: hypersthenia,

知覚神経: sensory nerve,

近づけない、手の届かない: inaccessible,

(deep and *i.* sites of metastasis),

力: force, (controlled *f.* is delivered with
elevators and forceps),

置換する、取って代わる: substitute,
(synthetic bone grafts *s.* consist of HA),

置換: replacement, (implant molar *r.*),
(化学的な) 置換: substitution,

チキソトロピーの、遥変性の: thixotropic,

蓄積: accumulation, (the *a.* of plaque,
materia alba and calculus), (動) 蓄積す
る: accumulate, (my fatigue
accumulated), (this substance
accumulates in the blood),

チクチクする: tingling, (*t.* tongue), →痛み、

蓄膿症、膿胸: empyema,

恥丘: mons pubis,

恥骨: pubis,

蓄積: accumulation, (plaque *e.*),

知歯: wisdom tooth, dens serotinus, 第三大
臼歯: third molar (tooth), (The last of

the three molar teeth. There are four third
molars, two in the lower jaw and two in
the upper jaw, one on each side. Also
called wisdom teeth),

知歯周囲炎 (日本語の知歯周囲炎に該当する
英単語は見当たらず歯冠周囲炎が最も近
い): pericoronitis,

致死の: fatal, lethal, 致死量: lethal dose
(LD), 50%致死量: 50% median lethal
dose, 致命率: fatality rate,

地図状舌: geographic tongue, benign
migratory glossitis, erythrema migrans,
mappy tongue,

チゼル、のみ、(動)チゼルで削る: chisel, オ

ーシャンビームチゼル: Ochsenbeim's

chisel,→のみ、
チタン：titanium (Ti), 純チタン：pure titanium, チタン合金：titanium alloy, チタンニッケル合金：titanium nickel alloy, チタン・6 アルミ・4 ヴァナジウム合金：Ti-6Al-4V alloy, チタンインプラント：titanium implant, 窒化チタン：titanium nitride, 酸化チタン：titanium oxide, 二酸化チタン：titanium dioxide, チタンメッシュ：titanium mesh, チタンプラズマコーティングインプラント：titanium plasma coating implant, チタンプラズマ溶射インプラント：titanium plasma sprayed implant (TPS),
乳を吸う：suck, (sucking habits),
乳首：nipple, (physiologically designed *n.*),
膣：vagina, (oral discomfort, anal and vaginal itching),
地図状舌：geographic tongue, lingua geographica,
チック：tic、有痛性チック(三叉神経痛など)：tic douloureux,
窒素：nitrogen, 窒素出納バランス：nitrogen balance, 窒化物コーティングインプラント：nitride-coated implant,
窒息：窒息：choke, (医) asphyxia, suffocation, (the patient died from *s.*), apnea, choke, 窒息する：suffocation, (一般) choke,
緻密骨：compact bone,
チップ、チップする：tip, (crown has been tipped),
知的障害：intellectual disability,
チトクローム《生化》：cytochrome,
知能指数：intelligence quotient (IQ),
血走った(目が)、充血した：bloodshot,

遅発性の：delayed, 遅発性筋痛：delayed-onset muscle soreness,
恥部：pubic area,
痴呆：dementia, (mild *d.* moderate *d.*, severe *d.*), senile, 基質痴呆：organic dementia, アルツハイマー型痴呆：dementia of Alzheimer, ピック病：Pick's disease,
地方病、風土病：endemic, endemic disease, 地方病性の：nostrate,
緻密骨：compact bone, dense bone, (the dense unyielding nature of mandibular bone),
致命的：(不運で致命的な) fatal, (~outcome), (*f.* systemic disease), (重大で致命的な、致死の) lethal, 致命的に：fatally, (the infection is the latter terminating *f.*),
ジメチルスルホキサイド：dimethylsulfoxide,
緻密骨：compact bone, dense bone, ~層：*c.* *b.* layer,
緻密層：lamina densa,
チモール混濁反応《検査》：thymol turbidity test (TTT),
着色(色素沈着)、しみ(組織の)：pigmentation, (動) 着色する：pigment, (tooth shade pigmented surface stain is typically applied), 着色、特色、採食：coloration, (granulocytic sarcoma, also referred to as chloroma due to the green *c.* of the tumor), 色を付ける、染める：tinct, 着色剤、汚点、しみ、染色剤、変色、汚れ、しみ：stain, (pigmented deposits on the tooth surface are called stains), 着色、着色の：tinctional, 彩色：coloration, 着色歯：stained teeth,

colored tooth, (light brown, dence black tar, gray-green, orange), 着色材、染料 : colorant, 着色したプラーク : pigmented dental plaque, タバコによる着色 : tabacco stain,	and planed to remove all deposits), 細心の注意を払って : fastidious, (<i>f.</i> patient care is essential),
着脱する (義歯などを) : insert and withdraw w. the prosthesis), 着脱方向 : path of insertion,	チューイングサイクル、咀嚼周期 : chewing cycle,
茶さじ : teaspoon, (provide 123 gr per teaspoonful ,	中咽頭 : oropharynx,
チャンネル : channel,	中央窩 : central fossa, 中央窩線 : central fossa line, 中央溝 : central fossa.
チャンファー、丸い面取り : chamfer,	中顔の : mesocephalic,
治癒、いやし、ヒーリング : healing, (healing cap), (wound healing), cure, 治癒する : be cured, get well, recover, 治癒経過 : healing process, 治癒力の : curative, (<i>c.</i> value), 治癒しやすい : amenable, (the lesions are very <i>a.</i> to local therapy), 治り 難い : stubborn, (some lesions stubbornly resist treatment), 十分には治癒していない : healing does not go to completion, 一次性治癒 : healing by first intention, healing by primary intention, primary healing, 二次性治癒 ; healing by second intention, secondary healing, 繊維性治癒 : fibrous healing, 変形治癒 (骨折の) : malunion, 治癒期間 : healing time, (average <i>h.t.</i> for a bone graft varies from 3 to 6 month), 治癒不能 (骨折の) : nonunion,	中隔 : septum, (形) septal, 中隔骨 : septal bone, 歯槽中隔 : alveolar septum, 鼻中隔 : nasal septum,
注意 : precaution, (in spite of all precautions a needle may break), 注意力 : attention, 注意深く : vigilantly, (remove it <i>v.</i>), 注意深く、念入りに : meticulously, (it must be <i>m.</i> scaled	中間位 : neutral position, (㊟中心位と混同しないこと)
	中間期 (細胞分裂の) : interphase,
	中間義歯 : bounded saddle denture,
	中間欠損 : intermediate, (tooth) missing,
	中間骨 (手根の) : intermedium,
	中間剤 (窩洞に充填物を入れる前に歯髄保護など目的で入れる歯壁に塗布する材料) : intermediate,
	中間細胞型(がんの) : intermediate cell type,
	中間支台歯 : intermediate abutment,
	昼間の、日中の : diurnal, (both <i>d.</i> and nocturnal),
	中級の、中間の : intermediate, (<i>i.</i> class),
	中空の : void, (<i>v.</i> fillers), 中空円柱状インプラント : hollow cylinder implant,
	鋳型 : mold,
	中継 : relay, (a <i>r.</i> of two autonomic neurons),
	中高年 : past middle age,
	中耳 : middle ear, 中耳炎 : otitis media,
	中歯槽管 《解剖》 : canalis alveolare mendii,
	注射 : (医) injection、(一般) shot, 点滴 : drip

i., 皮下～: hypodermic *i.*, (*h.j.* of 2 mL of the drug for 3 days), 皮内: intracutaneous *i.*, 筋肉～: intramuscular *i.*, 静脈内～: intravenous *i.*, 経皮～: percutaneous *i.*, 骨膜下注骨膜～: subperiosteal *i.*, 皮下～: hypodermic *i.* 骨内～: endosseous *i.*, 歯根膜内～: periodontal *i.*, 歯髄内～: intrapulpal *i.*, 注射する: inject, ～器: syringe, ～針; needle, ～筒: cylinder, barrel,

中手骨: metacarpal,

抽出: extraction, (chemical *e.* process), 抽出物: extract,

中心位: centric position, (*c.r.* has been registered in softened wax), (the *c. r.* record is made in the same manner), 中心咬合: centric occlusion, ワイドセントリック: wide *c. o.*, ロングセントリック: long *c. o.*, ポイントセントリック: point *c. o.*, ,

中心窩: central fossa,

中心関係、中心咬合位: centric relation (CR), (*c. r.* is a position that can be repeated),

中心感染: focal infection,

中心索症候群: central cord syndrome,

中心小体、中心粒: centriole,

鑄巣《理工》: casting porosity,

注水: irrigation, 注水、灌漑、灌流: perfusion, (vascular *p.*), 内部注水《インプラント》: internal irrigation,

虫垂炎: appendicitis,

中枢、中心: center, 嚥下中枢: deglutition *c.*,
 味覚中枢: taste *c.*, gustatory *c.*, 唾液分泌中
 枢: salivary *c.*, 自律神経中枢: autonomic

c., 化骨中心: *c.* of ossification, 呼吸中枢: respiratory *c.*,

中枢型睡眠時無呼吸症候群: central sleep apnea (CSA),

中枢神経: central nerve, 中枢神経系: central nervous system (CNS), 中枢(神経)性疼痛: central pain,

中枢神経興奮剤: analeptic,

中性子: neutron,

中性脂肪: neutral fat,

中切歯: central incisor, 上顎中切歯: upper central incisor, (square type, tapering type, ovoid-type),

鑄造: cast, molding, ～物、鑄造法: casting, molding, ～可能な: castable, ロストワックス遠心～法: lost-wax centrifugal casting method, 加圧～法: pressure casting method, 吸引～法: vacuum casting method,

鑄造冠: cast crown,

鑄造器: casting apparatus, 遠心鑄造機: centrifugal casting machine, 圧迫鑄造機: pressure casting machine, 真空鑄造機: vacuum casting machine,

鑄造床: cast plate,

鑄造用フラスコ: casting flask,

鑄造リング: investment ring, casting ring,

中毒: intoxication, (*i.* by mercury), poisoning, ヒ素中毒: arsenic poisoning, 中毒量: toxic dose, 中毒患者: toxic patients, アルコール中毒: alcohol poisoning, 食中毒: food poisoning, foodborne intoxication,

中等度の: intermediate,

注入する(石膏などを): pour, (*p.* plaster

to the tray), (*p.* the impression material), (*p.* up two set of study casts), inject, (*i.* the material around the teeth), (intravenous *i.* of Ringer lactate), (*i.* fluid hydrocolloid from the syringe.), (注射液など): impregnate, (点滴、静脈注射などの) 注入 : infusion, (印象剤、浣腸などの) 注入 : injection, (体内に[薬などの]水溶液を) 注入する : hydration, (hydration of the patient, and use of sialogogues), 注入器 (銃型の)、皮下注射器 : gun, injector, 中年、median age, middle age, 中年になったばかりの女 : a woman in early middle age, 中年層 : the middle-age generation, 中脳 : (医) mesencephale, (一般) -midbrain, 中胚葉、間葉 : mesoderm, mesenchyme, (形) mesenchymal, (*m.* tumor), mesodermal, (*m.* proliferation to form connective tissue), 中部構造 《インプラント》 : mesostruacture, チューブ陶歯 : tube tooth, 中膜 : tunica media, 注文書 : order sheet, 中和する : neutralize, (acid is neutralized with sodium bicarbonate), 中和する (望ましくない状態を) : antidote (within the body as an *a.* to aging), 中和する、妨害する、効力をなくする : counteract, (centering the occlusal contact counteracts the effect), チェアサイド : chairside, (time-consuming *c.* adjustment), (*c.* procedure), チェックバイト : check bite, (centric *c.b.*), (eccentric *c.b.*), (protrusive *c.b.*), (lateral *c.b.*), (the centric relation *c.* record

between the maxillary and mandibular cast),
チェーン・ストークス呼吸 : Chene-Stokes respiration (CSR), チェーストークス呼吸症候群 : Cheyne-Stokes breathing syndrome (CSBS),
～頂、頂上、峰、尾根 : crest, (bone *c.*), 頂、いただき、頭頂 : vertex, (形) crestal, (*c.* incision), vertical,
腸 : intestine, 腸、はらわた : bowel, 腸の : intestinal, 腸疾患 : enteropathy, 大腸 : large bowel, large intestine, 小腸 : small bowel, small intestine,
蝶咽頭管 : sphenopharyngeal canal,
超音波 : ultrasound, ～診断法 : ultrasonography, ～スケラー : ultrasonic scaler, ～搔把 : ultrasonic curettage, ～洗浄 : ultrasonic cleaning, ～歯ブラシ : ultrasonic tooth-brush, ～振動 : ultrasonic vibration, ～治療 : ultrasound therapy, ～スキャナー、～走査装置 : : ultrasound scanner, ～器具 : u. instrument, ～画像 : ultrasonogram,
聴覚 : audition, 聴覚の : acoustic, auditory, aural, 聴神経 : acoustic nerve, 聴覚過敏 : hyperacusia,
長顔の : dolicofacial,
長期間 : long-term, ⇔ short-term, 長期間経過症例 : long-term progress case, 長期間の追跡 : long-term follow-up, 長期安定 : long term stability, 長期間成功 : long-term success, 長期間の、経度の、縦線の : longitudinal, (*L.* studies), (*L.* wave), prolonged, (*p.* negative feeling),
腸球菌 : enterococcus,

張筋 : tensor,

蝶形筋 : pterygoid muscle,

蝶形骨 : pterygoid bone, os sphenoidale, ~大

翼 : greater wing of pterygoid bone, 蝶形

骨洞 : sphenoidal sinus, ~上顎骨の :

sphenomaxillary, ~下顎骨の :

sphenomandibular, ~口蓋骨の :

sphenopalatine, ~口蓋動脈 :

sphenopalatine artery,

蝶形骨下顎縫線 : pterygomandibular raphe,

張原線維 《解剖、組織》 : tonofilament,

徴候 : symptom, manifestation, (allergic *m.*),

(oral lesions are initial *m.* of the disease),

sign, (signs and symptoms), stigma (複)

stigmata, (stigmata of the tumor), 二次

徴候 : secondary sign, (形) 徴候がある、

きざしがある : indicative, (i. of cervical

strain),

調合、(薬、材料などの) 製法 : formulation,

(動) formulate, (this impression

material is formulated for use regular

impression),

蝶口蓋管 : sphenopalatine foramen,

蝶口蓋神経 : phenopalatine nerve,

蝶口蓋切痕 : sphenopalatine notch,

長口蓋の : dolichuronic,

彫刻する、芸術的に正確に形ずくる : sculpt,

彫刻する、刻む、(人生を) 切り開く : carve,

(名) 彫刻 : sculpture, carving, (c. in wax),

彫刻刀 : carver,

腸骨 : iliac bone, ilium, 腸骨稜 : iliac crest,

(implantation of outogenous marrow and

cancellous bone obtained from the iliac

crest),

腸骨移植 : iliac bone graft,

調査、研究 : investigation (*i.* of the disease),

詳細な調査 : detailed study, (これは、私

の調査結果です : This result is my

personal investigation), (さらなる調査が

必要である : further is necessary), 調査

する、吟味する : scrutinise, (the

application is rigorously scrutinized),

調剤 : dispensing, compounding, 調剤師 :

dispensing chemist, 調剤室 : dispensary,

チョウジ油 : clove oil,

調子が悪い、不調の : ailing, (a treated

implant is also listed as failed),

長寿 : longevity,

長寿食の、自然食の : macrobiotic, (彼女は長

寿の家系だ : *I* runs in her family),

聴診 : auscultation, 聴診する : auscultate, (*a.*

the TMJ joint by stethoscope), 聴診器 :

stethoscope,

聴神経 : acoustic nerve, 聴神経鞘腫 : acoustic

neuilemoma,

調製、製作 : fabrication, (denture *f.*),

調整、調節 : adjustment, (proximal contact

a.), 調整する : adjust, 再調整する :

readjust, 微調整する : fine-tune, 調整、調

節 : modulation, (*m.* of mitogenic activity

of fibroblast growth factors), (biomedical

m.), (pain *m.*), 調整する、周波を変える :

modulate, (that factor can *m.* the healing

process),

長石 : feldspar,

調節性咬合器 : adjustable articulator,

調節湾曲 : compensation curve,

腸線 : gut, catgut,

超速器具 : ultraspeed instrument,

超短波 : ultrashort wave,

腸チフス : typhoid fever, typhus abdominalis,	直線的な、線状の : linear, (<i>l.</i> distance from
超電圧 : supervoltage,	the mentum to the myohyoid muscle),
長頭の : dolichocephalic, long and narrow	直達骨折 : direct fracture,
face,	直腸 : rectum,
腸内細菌 : colon bacillus, 腸内球菌、エンテ	直面する (向き合う) : confront, (doctor ~s
ロコッカス : enterococcus,	the patient in any way),
蝶番関節 : ginglymoid joint, ginglymus,	直立性の : orthostatic, 直立に座る : sit erect,
ginglymo-arthrodia, 蝶番滑走関節 :	(<i>s. e.</i> and lick his lips while repeating the
ginglymoarthroidal joint, 蝶番軸 : hinge	word Emma),
axis, 最終蝶番軸 : terminal hinge axis, 蝶	直流 : direct curent, (交流を) 直流に変える :
番運動 : hinge movement, 蝶番咬合器 :	rectify,
hinged articulator,	貯蔵 (法) : storage,
超微細構造 : ultrastructure,	直角の、長方形の : rectangular, 直交座標 : <i>r.</i>
腸閉塞、イレウス : ileus, (intestinal	coordinate,
obstruction),	直感 : intuition, 直観力 : flair, (this disorder
鳥貌 : bird face, short-face, brachyfacial	usually present their history with
pattern,	draumatic <i>f.</i>),
長方形 : rectangle, (shape of oval, square	直交の : orthogonal,
and rectangle), (rectangular arch),	貯留 : stagnation, (<i>s.</i> of blood),
貼薬器 : applicator,	貯留嚢胞 : retention cyst,
貼薬する、薬を塗布する : apply a medicine	チラシ(小冊子)、(取扱い) 説明書 : brochure,
topically,	散らす(膿等を)、消散する、なくす : dissipate,
腸溶性の、腸で溶ける : enteric,	(inflammatory fluid is allowed to <i>d.</i>),
張力 : tensile , (lateral pressure of <i>t.</i>	チラミン《薬》 : tyramine,
stainless steel wire),	治療 : treatment, (sequence of the <i>t.</i>), 治療
聴力計 : audiometer,	(法)、医薬品 : remedy, 治療する :
鳥類の : avian,	treatment is carried out, 治療の :
腸肋筋 : iliocostalis,	therapeutic, (important in the <i>t.</i> regimen
調和 : harmony, (it must to be in h. with	is a positive dentist-patient relationship),
thefunctional activity of the	治療上の、救済的な : remedial, (<i>r.</i>
surrounding tissues), 調和した :	medication), 治療計画 : treatment plan,
harmonious, ⇔ disharmonious,	治療基準 : stndard of care, 治療後 : post-
(harmonious occlusion), 調和する、一	treatment, (p-t. healing), 治療可能な :
致する :correspond, (this dimension	treatable, (<i>t.</i> symptpms), 治療不可能な :
corresponds to a standard implant),	irremediable, (the teeth is <i>i.</i>),

untreatable, 補助治療 : adjunctive therapy, 過剰治療 : overtreatment, 治療専門家、医師 : therapist, 治療用補綴装置 : therapeutic prosthesis, チロジン《生化》 : tyrosine, チロスリシン《薬》 : tyrothricin, 沈下 : sinking, (義歯が) 沈下する : move downward, (the prosthesis moves downward oarcing around the axis line passing through the rest), チンキ剤《薬》 : tincture, チンキャップ《矯正》 : chincap, 鎮痙性の : anticonvulsive, 鎮静、鎮静作用 : sedation, (the pain is controlled by s.), (the preoperative s. of an apprehensive patient is necessary), 鎮静させる、和らげる : tranquilize, 鎮静、緩和 : mitigation, 鎮静させる : sedate, (sedating effect on the dental pulp), 鎮静させる、衰弱させる : debilitate, (苦痛などを) 和らげる、(恐怖などを) 鎮める : allay, (medications used for allaying anxiety), 鎮静、寛解、緩み、小康状態 : remission, (r. of acute symptoms), 鎮静状態 : sadation, 吸入鎮静 : inhalation s. (姑息的な鎮静) palliative, soothing, 鎮静の、鎮静剤 : sedative, 鎮静剤 : (医) sedative, tranquilizer, depressant, debilitant, sedative drug, anodyne, (一般) downer,, 沈着、沈着物、沈殿 : deposition, (bone d. on the remnant material), deposit, (fatty deposits lodged in the carotid arteries), 歯牙沈着物 : dental deosit, 鎮痛 : analgesia,

鎮痛剤 : painkiller, anodyne, analgesic, (a. dressing), obtudent, 処置日とその次の日だけの鎮痛剤 : pain medication only the day of and day after the procedure, 沈殿、沈降 : precipitatipon, 鎮吐剤、制吐剤 : antiemetic,



ツァンクテスト《検査》 : Tzanck test, 椎間板 : intervertebral disks (discs), (prolapsed disk),

追及 : follow, (these tumors were followed for 10 years),

椎弓 : arcus vertebralis, 遂行、達成、成果 : accomplishment, (a. of the operation), 椎骨 : vertebra, 椎骨動脈 : vertebral artery, ツイストドリル《インプラント》 : twist drill, 追跡、追行 : pursuit, (in p. of an atraumatic method for extracting teeth), 継続管理期間 : follow-up, (f.u. period), 追跡研究 : f.u. study,

槌打する : (軽く槌打する) : tap, tamp down, 椎体(脊椎の) : corpus vertebrae, (側頭骨)椎体の : petrosal,

対の : pired, (p. comparisons), (each patient's paired syringe),

椎傍神経節 : paravertebral ganglia, ツインワイヤー《矯正》 : twin-wire,

通院する : see a doctor regularly, 通院の : ambulant, 通院患者 : ambulant patient, out patient, ambulatory patient,

痛覚、痛覚過敏 : algesia, (形) algesic, algetic, 痛覚過敏症 : hyperalgesia, 一次性痛覚過

敏 : primary hyperalgesia, 二次性痛覚過敏 : secondary hyperalgesia, 痛覚鈍麻 : hypoalgesia, hypalgesia, 痛覚計 : algometer, 痛覚欠如 : analgesia,	槌 (マレット) : mallet,
通気 : aeration, 通気性 : ventilation, 通気率、多孔性 : porosity, 通気性菌 : facultative anaerobes,	槌 (骨) : malleus, hammer,
痛点 : tender point, (tender points are places on the neck, shoulders, backs hips, arms or legs),	続く : last, (the lesions / from 7 to 10 days),
痛風 : gout, 痛風結節、痛風結石 : tophus,	包む、囲む、封入する、隔離する : enclose, (the patient's hair is enclosed in a sterile wrapping),
使いやすい : high workable, 使いやすさ : ease-of-use,	つば : sputum, つば(ツバキ)する : spit (the s, frequently), つばを飛ばして話をする : speak spitting, 唾や痰を吐き出す : expectorate,
疲れ : fatigue, 疲れやすさ : fatigability,	つばみ形ポイント : barrel shaped stone,,
ツェンケル鉗子 : Zenker's forceps,,	爪楊枝 (つまようじ) : toothpick,
突き刺す、突き通す : thread, (fixture site should be threaded), 突き刺す、ぐいと押す、押し付ける : thrust, stick, 突き刺す、支柱を建てる : stab,	爪 : (医) unguis, (一般) nail, (pay attention to fingernails cuticles), (形) ungual,
付き添い、付き添う : (名) (動) escort, (a heavily patient must be escorted to and from the dental clinic),	爪を噛むこと : nail biting, (Stop sbiting your nails),
突き出す (あごなどを) : jut, (he is the jaw jut), 突き出す (歯肉などから) : protrude, (patient protrudes the mandible), (tooth protruding into oral cavity), 舌を突き出す : thrust, (the tongue is thrust hard against the palate),	冷たい、ジットリする : clammy, (skin becomes cold and clammy),
突き止める : localize, (the problem is localized),	(瀬戸物などの) 艶、光沢、輝き : luster, 艶、うわべの飾り : gloss, 艶、キラキラした輝き : sheen, 艶のある、光沢のある : glossy, (g. surface of denture), (うわぐすりを塗った) 光沢のある、glazed, 艶を出す、ニス塗った : varnish, glaze, (the porcelain is glazed), 顔の艶、肌の艶 : complexion,
付ける : 《会話》私の歯を修理してもらいたいのです : I want to fix my teeth.	詰める、詰め込む、圧縮する : compact, 詰め込み、圧縮 : compaction, (c, of bone may helpnto maintain fixation of the newly placed implant), 軽く叩いて詰め込む : <u>tamp, (the material should be tamped down and overfill should be avoided).</u>
作る : fashion (tray is fashioned from perforated brass),	強くて弾力のある : tough, (the impression material is fairly t.),
	貫く : pierce, (pierced by a pin),
	つり合わせる : counter-balance, (shrinkages

and expansions are counter-balanced), つりあわせる、調和(比例)させる: proportion, つる(足などが)、つれる、ひきつる: cramp, (I have a cramp in my leg), twitch, (twitching of the limbs),

て

手: hand, 利き手: dominant hand, 掌: palm, (形) 掌の: palmer, 手の甲: back of the hand, (手術前の)ごしごし手洗い: scrub, 手を使う、手製の、手動の: manual,

手足: limb,

手足口病: hand-food-and-mouth disease,

手洗い(手術前の)、ごしごし歯磨き、ごしごし洗う、ごしごし磨く: scrub, (the brush is scrubbed across the teeth),

定位置に置く: position,

DI《衛生》: debris index,

DIC、はん種性血管内凝固症候群: disseminated intravascular coagulation,

TIBC、総鉄結合能: total iron binding capacity,

低位咬合: infraclusion. infraversion,

DHA、ドコサヘキサエン酸《生化》: docosahexaenoic acid,

DNA(デオキシリボ核酸): deoxyribo-nucleic acid. DNA合成: synthesis of DNA, (the enzymes in DNA synthesis),

TNMシステム評価:(がんの分類法の一つ) TNM evaluation, (size of primary tumor (T), regional lymph nodes (N), presence of distant metastases (M) system evaluation),

Tf菌: Tannrilla forsythia,

TMD、顎関節症: temporo-mandibular disorder、TMJ、顎関節: temporo-mandibular joint,

TM: tooth mobility, (physiologic tooth *m.*), tooth movement,

DM, 糖尿病: diabetes mellitus,

DMF指数《生理》: decayed, missing, filled index, (DMF index),

DFDBA、脱灰凍結乾燥骨《外科、インプラント》: demineralized freeze-dried bone,

帝王切開《産婦人科》: caesarean operation,

低温生物学: cryobiology,

低下(質が)する: deteriorate,

低換気: hypoventilation,

釘管装置《矯正》: pin and tube appliance,

定義: definition, (*d.* of the problem), (動) 定義する、境界を定める: define, (an ill-defined radiolucency),

定期的管理: regular check-up,

定期健診: periodic recall, (periodic recall and maintenance), periodic check-up, (periodic monthly check-ups then followed),

DQ: developmental quotient,

デイキン液: Dakins solution, (dilute sodium hypochlorite),

低緊張の: hypotonic, (*h.* musculature),

低血圧: hypotention,

定型的な: typical, 定型的な、(自己刺激制御方式の、一定の経過をたどる: self-limiting, 非定型的な: atypical,

低血糖: hypoglycemia,

抵抗形態《充填》: resistance form,

低呼吸: hypopnea,

抵抗力 : resistibility,

T 細胞 : T-cell

酸素血症 : hypoxemia, hypoxia, (④ 無酸素

症 anoxia と混同しないこと),

停止 (筋肉の) 《解剖》 : insertion, 停止 (痛み

などの) : cessation, (成長、心臓などの) 停

止 : arrest, (a. of growth), (cardiac a.),

TCH、歯牙接触症 : tooth contacting habit,

TGF : transforming growth factor,

TCP、三 燐 酸 カ ル シ ウ ム : tricalcium phosphate,

ティッシュ、(人間や動物の顕微鏡的な) 組織、(薄くて軽い) 織物、紙 : tissue, (tissue treatment, tissue conditioner),

ティッシュコンデショナー 《補綴》 : tissue conditioner, ティッシュエンジニアリング 《歯周、インプラント》 : tissue engineering, ティッシュパンチ 《インプラント》 : tissue punch,

挺出 : protrusion, (矯正などによる歯の) 挺出 : extrusion, (e . of teeth), (orthodontic e.), (e. or intrusion), elongation, (e. of the tooth), 挺出する : extrude, 挺出歯 : extruded tooth, supererupted tooth,

ディスインテグレーション 《インプラント》 : disintegration,

定数 : constant, 弾性定数 : elastic constant,

デイスキネジア、デイスキネジー、随意運動障害 : dyskinesia,

ディスク : disk, (アブレーションディスク、削去用ディスク : abrasive d., ダイヤモンドディスク : diamond d., 片面ディスク : safe-side d., サンドペーパーディスク :

sandpaper d.,

ディスク法 《細菌》 : disk method,

ディスクルージョン、臼歯離開咬合 : disclusion,

ディスクロージングワックス、検知用ワックス : disclosing wax,

ディスクルージョン : disclusion,

デストラクション、仮骨延長術 《インプラント》 : destruction,

訂正、修正 : retrieval,

定説 : dogma,

停滞、よどみ : stagnation, (s. of exudates), (circulatory s.),

低体温 : hypothermia, 低体温麻酔 : hypothermic anaesthesia,

低蛋白血症 : hypoproteinemia,

定着(レントゲン、写真などの) : fixation,

t,d,s, : 1日3回服用 ter die sumendus,

Td 菌 : Treponema denticola,

TTT、チモール混濁反応 《検査》 : thymol turbidity test,

程度、度合い(病気の悪化などの) : magnitude, (an acute illness of such m.), 程度 : degree, 軽い程度、軽症 : mild, 中程度 : moderate, 高度、重症 : severe,

DDAVP、酢酸デスマプレシン 《生化》 : desmopressin acetate,

TP、総蛋白 《検査》 : total protein,

TPR、体温、脈拍、呼吸, : temperature pulse respiration,

TPS 《インプラント》 : titanium plasma sprayed,

DFDBA、脱灰凍結乾燥骨 : demineralized freeze-dried bone allograft,

DBM、脱灰骨基質 : demineralized bone

matrix,
 ディビスクラウン《補綴》: Davis crown,
 底部、底: bottom, (*b.* of gingival pocket),
 デイ・プラーキング《衛生》: de-plaquing,
 ディンプル、えくぼ《補綴》: dimple, (*d.* on the crown),
 低プロトロンビン血症: hypoprothrombinemia,
 剃毛(手術領域の)《外科》: shaving of the operative area ,
 低融金属、低溶金属: low-fusing metal,
 TCA サイクル: TCA cycle, (tricaroxylic acid cycle),
 TPHA テスト《検査》: treponema pallidum hemagglutination test,
 定量、(数量の) 決定: quantitation, 定量分析: quantitative analysis, 定量評価: quantativeevaluation, (定) 量的に: quantitavely,
 T リンパ球: T lymphocyte,
 テーパー、先細り、漸減: taper, (the desired taper of the tooth preparation), (self-holding *t.*), (self-releasing *t.*), (recommended taper of prepared surfaces and wallsrange from 2 to 7 degrees), (形) テーパー型の、先細りの: tapered, (*t.* coping , *t.* abutment, *t.* joint, *t.* implant),
 デオキシコルチコステロン《生理》: deoxycorticosterone,
 デオキシピリノリン《薬》: deoxypyrimidin (DPD),
 デオキシリボヌクレアーゼ《生化》: deoxyribonuclease,
 手がかり: clue, (it may offer some *c.*),

デカドロンエキシル: decadron elixir,
 デカルボキシラーゼ、脱炭酸酵素: decarboxylase,
 適応(症): indication, (*i.* for this procedure will be listed below), (形) 適応する、必要な、有効な: applicable, (動) 適応する、必要である: indicate, (preoperative adjustment of occlusion is indicated),
 適応障害《精神科》: adjustment disorder,
 的確な: 適切な、正確な: accurate, 適切な、要を得た: pertinent, (*p.* medical history), 適切な、妥当な: relevant, (*r.* finding of examination), 適切に、うまく: aptly, (it is described very aptly by him),
 適合、適応: (修復物の) fitness, 適合、適応、順応、調節: adaptation, 適合(組織との親和) compatibility, 適合(薬などの適切なこと) suitability, (形) 適合した、調和する: congruous, 適合した、調和した: congruent, (the bone site can be made *c.* to the implant), fitted, (it must be perfectly *f.* on the abutment), (well *f.* to the abutment), (a tight-fitting band), adaptable, (these scalers are very convenient and *a.* each tooth,also very handy), ピッタリ適合した: tight-fitting, (a *t.-f.* casting), (動)適合する: fit, (tissue fits snugly around the implant), 適合が悪い: ill-fitted, 適合しない、不適合: misfit, (fixture-abutment misfit), ill-fitting, (ill-fitting crown),
 デキサメタゾン《薬》: dexamethazone,
 摘出する: (臓器移植、治験用に) 摘出する, (名) (臓器移植、治験用の) 摘出: harvest, (腫瘍などをくるっと取り出す)摘出する、(細

胞から)核を取り除く:enucleate,(totally enucleated of the tumor),(the cyst enucleated in one piece),(enucleation with removal of the associated tooth),摘出する、移動する、抜歯する:removal,(bone *r.*),(tooth *r.*),摘出する、切除する、根絶する:extirpate,(they are extirpated surgically),削除(したもの)、切除(術)、摘出:excision, ~切除、摘出する:excise from,(tissues were excised),(implant was excised),切除、根絶、摘出する:extirpate,(pulp extirpation),(tumors are extirpated surgically),抜歯する、引き抜く、抽出する、娩出する:extract,(the cyst is no indication for extracting it),(腫瘍、嚢胞などの)摘出:enucleation, excision,(*e.* biopsy),
 デキストラン《薬、生化》:dextran,
 デキストリン、糊精《生化、薬》:dextrin,
 デキストロース《薬》:dextrose,(saline or *d.* solution during long operation),
 適する、ふさわしい:appropriate, ~に適した:suitable(*s.* tool for treatment of dentine hypersensitivity),適合した、おあつらえの tailored,(orthognathic treatment must be *t.* to the growth pattern),
 適正な:、公平な:、equitable, 適正な荷重:*e.* load,適正化する、最大限利用する、最善にする:optimize, 適正さ、適切:adequacy,(*a.* of the gingival embrasure form),pertinent,(*p.* information is called the assessment),
 出来栄:performance,(仕事の~:work *p.*),
 できもの:boil,(口の中の)できもの:canker,

あざ(生まれつきの):birthmark,(打撲の後の)あざ:bruise,
 摘要(大意):synopsis,(a short *s.* is required),summary, outline, resume,
 適用:application,(diligent *a.* of muscle-relaxation and trigger-point therapy),
 手首:wrist,(形)carpal, 手根骨:calpal bones,
 テグレトール《薬》:Tegretol,(carbamazapineの商品名),
 テクロン、ケクロンの毛:sable,(*s.* hair brush is suitable for applying the die spacer),
 てこ:lever,(raise with the *l.*),てこの作用:leverage,(*l.* to the abutment),
 凸凹のある、起伏の多い:rugged,(*r.* out-line),
 デコルチケーション、皮質骨穿孔《インプラント》:decortication,
 手ごわい:formidable,(*f.* symptom),
 手触り:texture,(surface *t.*),
 定植、釘植《外科》:gomphosis,
 デスモイド、靱帯様の、線維様の:desmoid,
 テストステロン《生化》:testosterone,
 デスモゾーム《解剖、組織》:desmosome,
 テタニー、強直性痙攣:tetany,
 でたらめな:indiscriminate(*i.* treatment),
 鉄:ferrum(Fe),iron,(形)鉄の:ferro
 鉄欠乏症:sideropenia,
 鉄欠乏貧血:iron deficiency anemia,
 鉄剤:iron preparation,
 撤去、切除する、摘出する:excise,(implant was excised),撤去する:remove,(do not *r.* the impression until gelation has been complete for 2 minutes),(the crown is removed with a back-action crown remover),撤去鉗子:removing pliers,
 TEK(テック)、暫間クラウン《保険用語》:

(ドイツ語 : Temporärekrone の略)、	surface),
temporary coverage, temporary crown,	デプスゲージ、深度測定器《歯周》: depth
shell crown, plastic shell, provisional	gauge,
crown, interim crown,	デブリー、歯垢、残骸: (デブリーは debris フ
鉄ちん《技工》: anvil,	ランス語) ,
徹底的な、綺麗な、綿密な: accurate, (a .	デブリードマン、廓清、創傷浄化、創面から壊
removal of granulation tissue), 徹底的な、	死組織などの切除《外科》: (デブリードマ
思い切った、強烈な: drastic, (d. major	ンは debridement フランス語だが、英語的
surgery), 徹底的な、根本的な、完全な:	にデブリードメントと言う人もいる) ,
radical, (resection may be more radical),	テフロン: teflon,
徹底的に: scrupulously, (dentures may	テマゼパム《薬》: temazepam,
constitute a nidus for reinfection and	テム (TEM)、透過型電子顕微鏡:
must be s. cleansed),	transmission electron microscopy,
出っ歯《会話》 buckteeth, (You have	デメロール《薬》: Demerol, (meperidine
buckteeth and the teeth don't seem to	hydrochloride の商品名),
stick out), (you have buckteeth), (医)	デュアルキュア《材料》: dual-cure, デュアル
projecting teeth,	キュアードセメント: dual-cured cement,
テトラサイクリン系抗生物質: tetracycline	デュアルポリメライズドレジン: dual-
antibiotics, クロロテトラサイクリン:	polymerized resin,
chlortetracycline, オキシテトラサイクリ	デュラレーレジン: Duralay resin,
ン: oxtetracycline,	超音波の: ultrasonic, 超音波ブラシ:
テトラゾリウム《検査》: tetrazolium,	ultrasonic toothbrush, 超音波スケーラー:
手に負えない、治療しにくい: intractable, (i .	ultrasonic scaler,
pain) ,手に負えない、扱いにくい、治り	聴覚の: acoustic,
にくい、耐火性の、免疫力のある: wild,	テリゴイドインプラント: pterygoid implant,
(everything went really wild), refractory	デルタ睡眠: delta sleep,
(r. rickets), uncontrolled, (u. infection),	テルピン油: turpentine,
手抜き、怠慢、省略: omission,	デルマトーム、ダーマトーム、皮節、皮膚分節
デノボ、初めから、新たにもう一度、再度の:	《生理、解剖》: : dermatome,
de novo, (de novo bone tissue without	テレスコープクラウン、二重金冠: telescope
reduction),	crown, テレスコープコーピング:
手袋: gloves, (rubber gloves), (an ungloved	telescope coping,
person to open the package and either	手を使う、手動の: manual, (m. control), (m.
transfer the contents to a gloved person	dexterity),
or allow its contents to fall onto a sterile	転移: metastasis, (m. to the cervical nodes

mey be detected by bimanual palpation of local sites), (<i>m.</i> from adenocarcinoma of colon), (<i>m.</i> to regional lymph nodes during extension), (it rarely produces metastases), (形) metastatic, metastasizing,), 転移性癌 : metastatic cancer, 微小ガン組織の転移 : micrometastasis, 転位病巣 : metastatic lesions, 遠隔転移 : distant metastasis, (動) metastasize, (sarcomas <i>m.</i> to the lungs through the bloodstream),	電気泳動 : electrophoresis,
転位、位置異常 : dislocation., migration, (labial migration), 転位、きかん置換、器官の転位 : transposition, (nerve <i>t.</i>), (transposed branches of the hypoglossal nerve), relocation, (relocating frenum attachment), (形)転位の : ectopic, (ectopic tooth), heterotopic, displaced, 転位歯 : displaced tooth, malposed tooth,	電気回路 : circuitry,
電位差 : potential difference (<i>p.d.</i>),,	電気化学 : electrochemistry.
展延性のある : ductile, (<i>d.</i> metal), malleable,	電気凝固 (法) : electrocoagulation, (<i>e.</i> is dehydration and coagulation of tissue and hemostasis, using a moderately or highly damped high frequency alternating current),
展延性 : ductility, ductileness,	電気外科 : electrosurgery, (<i>e.</i> refers to the use of high frequency electric currents for cutting or destroying tissue),
天蓋 : roof of the pulp chamber,	電気検査 : electric testing,
電解液、電解質 : electrolyte, (balanced <i>e.</i> solution), (形) electrolytic, electrotical,	電気研磨 : electropolishing,
電解研磨 : electropolishing,	電気歯髄診断機 ; electric pulp tester,
展開する : develop, (implant zone develops with after implantation),	電気焼しやく : electrocautery, (bleeding may be controlled with <i>e.</i>),
電解質、電解液 : electrolyte,	電気切開 : electrosection,
添加剤 : additive,	電気切断 : electrosection,
癲癇 : epilepsy, (形) epileptic, (<i>e.</i> patient),	電気分解 ; electrolysis, ～する : electrolyze, (形) ～lytic,
転換 : conversion (<i>c.</i> of the partial into full denture), (metal stress is converted to muscle tension),	電気麻醉 : electroanaesthesia,
転換性障害《精神科》 : conversion disorder,	電気メス : electric scalpel, electric knife,
	電気メスを使った手術(歯肉などの) : electrosurgery,
	電気メッキする : electroplate, (electroplated die) ,
	電気療法 : galvanotherapy,
	電極 : electrode, (<i>e.</i> tips),
	電気療法機器 : electrotherapy device,
	デング熱《内科、眼科、耳鼻科》 : dengue fever,
	典型、縮図 : epitome, (<i>e.</i> correspond to amino acid), 典型、模範 : model, (<i>m.</i> of womanhood), 典型、代表 : typicalness, 典型的な : typical, typical, (<i>t.</i> form of the teeth),

電撃性の(痛みが): lancinating (pain),
 点検: inspection,
 点在する、散在させる、撒き散らせる:
 intersperse, (interspersed by large
 numbers of fibroblasts),
 電子: electron,
 電子カルテ: electric medical record (EMR),
 電子顕微鏡: electron microscope,
 電子工学の: electronic, (*e. circuitry*),
 展示場: exhibition area, *rom 9 to 5 PM.*),
 デンシトメトリー、密度分析法: densitometry,
 電磁波: electromagnetic wave,
 電磁場: electromagnetic field,
 電子放出: photoemission,
 電子密度: electron density,
 点状出血: petechia, (複) petechiae,
 点状舌: dotted tongue,
 TENS、経皮的電気刺激: transcutaneous
 electrical nerve stimulation,
 展性、軟化: softening, (*s. of gold alloy*
casting), 展性、適応力、融通性:
 malleability, 可鍛性金属: malleable metal
 点線: dashed line, ⇔ solid line, (the
 distance is given by the *d. l.*), dotted line,
 (*d.l.* shows line of incision),
 伝染、伝染病、感染: infection, 伝染、伝達、
 遺伝: transmission, 接触感染: contagion,
 顕性感染: apparent infection, 不顕性感
 染: inapparent infection, (接触による) 伝
 染する: be contagious, transmit, (this
 disease is transmitted through the air),
 catch, (tow hundred pupils caught the
 flu), plague, (Koch showed that rats
 were the vector of bubonic *p.*), 伝染病:
 communicable disease, epidemic disease,

(接触による)伝染病: infectious disease,
 (infectious diseases orevention), 伝染病、
 疫 病: plague, (plagued spirochetal-
 fusiform infection), 否 伝 染 病: non-
 commucable disease (NCD), 伝 染 性:
 communicability, (transmissible
 subcutaneous abscess), transmissibility,
 否伝染性の: non-infrctious,
 転送する、伝達する、写す: transfer, (load
 transfer from implants to bone),
 伝達(情報、メッセージなどの): transmission,
 (*t. of the force to this bone*), (*t. of*
noxious stimuli), 伝 達 する: convey,
 (stimulus conveyed to the bone
 tissue), (he conveyed his personal
 greeting in video message), conduct,
 transmit, (load is transmtted to the
 nearest support), 伝 達 性:
 transmissibility,*
 伝達麻酔: conduction anaesthesia, block
 anaesthesia, (extraction under inferior
 alveolar nerve block),
 デンタル、歯の、歯科の: dental, 歯列弓: *d.*
arch, 歯科助手: *d. assistan*, 歯石: *d.*
calculus, 齲蝕: *d. caries*, デンタルフロ
 ス: *d. floss*, 歯式: *d. formula*, 歯科衛生
 士: *d. hygienist*, 歯牙係数: *d. index*, デ
ンタル IQ: dental IQ, 歯科技工士: *d.*
 (laboratory) technician, 歯科医師会: *d.*
society, 歯科用石膏: *d. stone*, 歯科治療ユ
 ニット: *d. unit*,
 テンチ《人名》: Tench ,
 デンチメーター、歯牙周囲計測器: dentimeter,
 デンチュリスト、義歯専門歯科医師:
 denturist(カナダで許可されている義歯

治療のみできる歯科医師),

デンチンブリッジ《病理》: dentin bridge,
 点滴: drip, (the druds is given in the form
 of a d.) , d. infusion , intravenous d.,
 intravenous infusion, instillation,

点々を付ける: stpple,

転倒: fall, tumble, upset,

伝導: conduction, (conductive hearing loss),

伝導路切断 (術): tractotomy,

電動歯ブラシ: electlic tooth-brush,

填入: packing,

天然歯: natural tooth, 天然歯列: natural
 dentition,

天然痘、疱瘡: small-pox, variola, 尋常性天
 疱瘡: pemphigus vegetans,

臀部、(腰をかけると、椅子に触れる内側部分):
 buttock, (外側の左右に張り出している部
 分): hip, (形) gluteal,

転覆力《補綴》: rock strength, 転覆試験: rock
 test,

添付書: accompanying documents,

テンプレート (鋳型)、型紙、雛形: template.
 (surgical template) , (make a t. of
 tinfoil or wax template of the recipient
 site to be used as a pattern for the graft),

咬合用テンプレート: occlusal t., 外科用テ
 ンプレート: surgical t., レントゲン写真

的テンプレート: radiographic t.,

澱粉: starch, (澱粉食品: starch food),

天疱瘡: pemphigus, (skin conditions with
 bulous eruptions), 尋常性天疱瘡:
 pemphigus vulgaris, pemphigus
 vetans, pemphigus foliaceus,
 (pemphigoid bullous inflammation), 落
 葉状天疱瘡: pemp foliaceus, 紅斑性天

疱瘡: erythematous pemphigus, 増殖性

天疱瘡: 癬痕性類天疱瘡: cicatrical
 pemphigoid, (形) 類天疱瘡の:
 pemphigoid,

テンポラリー・セメント: temporally cement,

〜ストッピング: t. stopping,

電離: ionization, 電離放射線: ionizing
 radiation,

と

問いあわせる、照会する、調べる: refer, (a
 patient *referred* for replacement of a
 canine after extraction of the cracked
 root),

洞、腔、洞(骨の): sinus, antrum, (形) antral,
 (antral carcinoma), 洞底: antral floor,

銅: cupper, cuprum (Cu), (c. amalgam),

胴 (身体の): torso, trunk,

同意: agreement, 同意書: consent form, 親
 の同意書: parental concent form,

同位元素、アイソトープ: isotope,

同位酵素、アイソザイム: isozyme,

統一見解、意見の一致、コンセンサス:
 consensus, (the c. of many studies),

同一の、まったく同じ、一致する:
 identical, (i. lesions),

動因、手段、媒介、病原体、作用物質、薬剤:
 agent (injurious a.),

等運動訓練: isokinetic exercises,

ドウヴァン・クラスプ《補綴》: De Van clasp,

等価《生化、生理》: equivalence, (形)
 equivalent,

透過: penetration, permeableness, (形) 透

過する: permiable, (the membrane is

permeable to potassium),
 同化、同化作用《生理》: anabolism, (形)
 anabolic,
 頭蓋(とうがい、ずがい)「骨」: cranium, 頭
 蓋冠: calvaria, 頭蓋腔: cranial cavity, 頭
 蓋底: cranial base, 頭蓋骨折: skull
 fracture,
 頭蓋下顎骨固定術: craniomandibular
 fixation,
 頭蓋顔面の: craniofacial, 頭蓋顔面角: c.
 angle,
 頭蓋頰の: craniobuccal,
 頭蓋計測: cephalometry, 頭蓋計測の:
 cephalometric,
 透過性、浸透性: permeability, (capillary *p.*),
 透過性(レントゲンの): radiolucency, ⇔
 radioopacity, レントゲン透過性が良
 い: well lucency, (the radiograph shows a
 well-circumscribed lucency with an
 associated impacted tooth), (液体などが)
 透過性のある: permiable, (*p.* membrane),
 (光などが)透明な、透過する: translucent,
 (*t.* ceramic), 不透過性: impermeability,
 透過像(X線の): radiolucent area, 不透過
 像: radioopaque area,
 動眼神経: oculomotor nerve,
 陶器: tottery, chinaware, ceramic ware,
 porcelain, 陶材: ceramo-material,
 動悸: palpitaion, thumping of heart, (動悸
 がし始めた: My heart began to beat
 (throb). 動悸が収まった: My palpitation
 subsided),
 同期、同時: synchronous, (identify *s.* tumor),
 (*s.* reflex), (*s.* proliferation),
 動機、(～への) 励み、(～しようとする) 気

持ち: incentive, (the *i.* for the
 experiment), 動機付け、やる気を起こすこ
 と: motivation, (patient *m.*), incentive,
 (動) motiivate, (highly motivated patient),
 (patients should be motivated to want to
 keepnhis mouth clean),
 道義的: moral,
 洞鏡(上顎洞などの): antroscope,
 道具(用具、設備)一式: armamentarium,
 統計: statistic, 臨床統計: clinical *s.*, 統計
 によれば: statistics show, (21 例中 8 例
 (21.8 %): statistics show 8 out of 8
 (21.8 %), 統計的な: statistical, 統計的分
 析: *s.* analysis, 統計的に: statistically,
 同系移植: isotransplantation,
 同形歯の: homodont, ⇔ heterodont,
 同形の: isomorphous,
 凍結、氷結: gelation, (*g.* temperature),
 凍結外科、冷凍外科療法: cryosurgery,
 頭頸部の: craniocervical,
 洞結節: sinus node,
 凍結乾燥骨《インプラント、外科》: freeze dry
 bone (FDB), 凍結乾燥骨材: freeze-dried
 bone allograft (FDBA),
 凍結乾燥の: lyophilic, lyophile, 凍結乾燥
 する: lyophilize, (lyophilized mineralized
 bone), 凍結乾燥法: lyophyle process, 真空
 凍結乾燥: lyophilization, (lyophilized
 plasma),
 凍結外科: cryo-surgery.
 瞳孔: pupil, (形) pupillary, ～が拡大する:
 pupils are dilated, 瞳孔縮小(縮瞳): miosis,
 meiosis, 瞳孔反射: pupillary reflex, 瞳孔
 間線《補綴》: interpupillary line,
 統合失調症: schizophrenia,

とう骨:radius, (複) radii, とう骨神経:radial nerve,

透光する、透照する:transilluminate, (名) transillumination.

陶材:porcelain, 高融陶材:high fusing porcelain, 陶材前装冠:porcelain fused metal crown, 陶材ジャケットクラウン:porcelain jacket crown, 陶材ブリッジ:porcelain bridge,

動作経路(身体各部の)、伝達経路(神経細胞の連なった):pathway, (the habitual *p.* is the working *p.* of the mandible),

当座の:intern, 暫間義歯:*i.* prosthesis, (*i.* crown),

陶歯:porcelain teeth, 陶歯前装鑄造冠:porcelain veneered cast crown, 有孔陶歯:tube tooth,

透視:fluoroscopy, 透視診断:fluoroscopy,

糖質:saccharide,

同質性、均一性:homogeneity, ⇔ anisotropy, 同質の、同種の:homogenous, (surface is *h.* reddish brown),

同時に起こる:synchronous, (*s.* recruitment of peripheral muscle fibers associated with occlusion), 同時に発生する:synchronize, (the occlusal position is synchronized with healthy muscle function),

等尺性(収縮):isometric (contraction),

同種の:homogenous, ⇔ heterogenous, cf, autogenous,

同種移植(動物の骨などの):allograft,

凍傷、しもやけ:frostbite, chilblain,

同情:sympathy, 同情心のある:sympathetic,

洞状の:sinusoidal,

動静脈の:arteriovenous,

同心円の:concentric, (*c.* arrangement), (*c.* circular movement),

陶酔感、至福、意気揚々:euphoria,

トゥースインジケーター《補綴》:tooth indicator,

トゥース・トゥー・トゥース・コンタクト:tooth to tooth contact,

同性愛:homosexuality, (形) homosexual, (homosexual man), invert,

透析:(hemo) dialysis, (動) dialyse, 透析機:dialyser, 透析液:dialyzate, 人工透析:artificial dialysis, 透析性骨障害:dialytic osteopathy,

洞切開:antroscopy,

同側の:homolateral, (体の同側) ipsilateral, (the *i.* artery),

糖蛋白:glycoprotein, glucoprotein, glycpptide,

頭頂:vertex, parietal, calvaria, 頭頂部:calvaria, parietal region, 頭頂の:parietal.

等張性の:isotonic, 等張液:isotonic solution, 等張の洗浄液:isotonic irrigation fluid,

頭頂骨:parietal bone, os parietale,

等長撮影法:bisecting-angle technique, isometric technique, 同張性:isotonicity, (形)isotonic,

等張性:isotonic, (*i.* contraction of the muscles),

疼痛:pain, dolor, sorenese, 疼痛性の、疼痛の原因となる:algogenic, 疼痛の伝達:transmission of pain, 拍動性疼痛:throbbing pain, 顎関節痛:temporomandibular joint pain, 月経痛:periodical pain, 電撃様疼痛:shooting

pain, 激痛 : intense pain, 灼熱痛 : causalgia, burning pain, 残留痛 : residual pain, 放散痛 : irradiating, radiating pain, 相同性の疼痛 : homogenous, pain, radiating pain, radiating pain, (痛みが)治まる : subside the pain, (the pain does not s.),

疼痛恐怖症 : algophobia,

疼痛原因物質 : algogenic substance,

疼痛上行路 : ascending pain pathway,

疼痛性障害 (精神疾患の) : pain disorder,

同定《細菌》 : identification,

同等の : equivalent, (mechanical equivalents of jaw position),

糖尿 : glycosuria, glucosuria,

導尿 : urethral catheterization,

糖尿病 : diabetes, diabetes mellitus (DM), (diabetics with gum disease were three times more likely to have heart attacks than those without gum disease), コントロールされていない糖尿病 : uncontrolled DM., 糖尿病誘発性の : diabetogenic, インスリン非依存性糖尿病 : non-insulin dependent diabetes mellitus (NIDDM),

頭皮 : scalp,

頭部の方へ : cephalad, ⇔ caudad, (形) cephalic, (c. blood vessel), cranial,

頭部 X 線規格写真、セファログラム : roentgenographic cephalogram, cephalograph,

頭部測定法、セファロメトリー : cephalometry,

等辺 : equilateral (e. triangle of Bonwill),

洞房結節、S A 結節 : sinoatrial node,

等方性の : isotopic. (cortical bone is assumed to be i. homogeneous),

動脈 : artery, (形) arterial (a. blood supply to face), 動(静)脈瘤 : aneurysm, 外膜 : tunica adventitia, 中膜 : tunica media, 内膜 : tunica intima, 交通動脈 : communicating artery, 動脈疾患 : arteriopathy, 動脈内の : intra-arterial,

動静脈の : arteriovenous, 細動脈 : arteriola,

動脈炎 : arteritis, 多発性動脈炎 : polyarteritis, 動脈周囲炎 : periarteritis,

動脈血酸素飽和度、サチュレーション : arterial oxygen saturation (SaO₂), 最低値 : minimum SaO₂,

動脈硬化症 : arteriosclerosis, 冠動脈硬化症 : coronary arteriosclerosis,

動脈と静脈の : arteriovenous,

動脈内注入 : intraarterial infusion,

動脈内膜炎 : endarteritis,

動脈瘤、静脈瘤 : aneurysm,

動脈瘤様骨嚢腫 : aneurysmal bone cyst,

透明な : translucent, opaque, 透明層《病理、組織》 : stratum lucidum, lamina lucida.

半透明 : translucency,

頭毛 : hair,

投薬 : medication, administration, 投薬する : administrate, (2% Xylocain is administered prior to the incision), medicate, (canal has been cleansed and medicated), 投薬量 : dosage, (d. advice by the doctor), (d. ranges from 2mg, 1 tab t.i.d. to 5 mg tid), medication, 分服で : in divided dosage, (1 to 2 gr in divided dosage, either four times during the day or every 6 hours),

投与 : dosage, medication, administration, 薬剤投与 : drug administration, 大量投

与 : high dosage, 経口投与 : oral administration, 投与 (薬の) する : administrate, (how it is to be administrated, by mouth, intramuscularly, etc), dispense with, (d. with drugs), give medication to a patient, 患者に投与する : give medication to a patient, (抗生剤を)連続投与する : give a series of (antibiotics) ,

動揺 (歯の)、mobility, 歯牙の動揺 : tooth mobility, シーソーする、上下に動く : teeter, (t. of the tooth), ゆっくり動く (swing より小さい揺れ) rock, (tooth is rocked back and forth), 動揺する、動く、動きやすい : mobile, (the remaining teeth were m. with periapical pathology), 動揺する、緩む、たるむ : loosen, (the tooth has been loosened and moved), 小刻みの動揺、揺さぶられうこと : jiggle, (jiggling movement of teeth), 微細な動揺 : micromovement, 動揺度 : mobility, degrees of mobility, 動揺過多 : hypermobility, 動揺歯 : mobilized tooth, 歯牙の生理的動揺 : physiologic mobility of the teeth, 病的動揺 : pathologic mobility, 八の字型の動揺 : figure-eight movement, 動揺度試験 : mobility test, 動揺歯 : moving tooth, mobile tooth, (心の) 動揺、心配 : perturbation,

トゥレット症候群 : Tourette's syndrome,

登録 : resistration, (帳簿への)登録 : entry,, (団体への) 登録 : enrollment (in), 登録者 : enrollee, (5000 enrollees),

ドー、練り粉状、餅状《補綴》 : dough. ドー状態の時 : doughy stage,

トーチ《補綴》 : torch, (alcohol t.),

ドーパミン《生理、生化》 : dopamine,

トーンス (静止状態での正常な筋肉の緊張) 《生理》 : tonus, (形) tonic, (t. spasm),

トームス繊維 : Tome's fibers, = dentinal fiber,

トームス突起 : Tomes' process,

通り抜ける、取り決める、乗り越える : negotiate, (this canal is best negotiated first by ~),

討論 : discussion, 討議、論争 : debate, 論議、口論、紛争 : dispute,

溶かす(物を熱などで)、溶ける : melt, (m. the wax), (melting point), dissolve, dissolve, (scid dissolves teeth and causes decay), (形) 溶けた : molten, (molten wax),

尖りくい、棚、棚状細胞 : palisade, (p. arrangement of the outer row of cells of follicles),

ドキシサイクリン《薬》 : doxycycline,

トキソイド、変性毒素 (免疫を失わないように無毒化したもの) : toxoid, (tetanus t.),

特異性 : specificity, idiosyncrasy, (形) ~の、特異的な : specific, 特異性炎 : specific inflammation, 非特異性の、一般的 : nonspecific,

特異体質 : idiosyncrasy, ~の : idiosyncratic, (i. reaction to drug),

読影 : interpretation,

毒液 (ヘビ、サソリ、ハチなどの) : venom,

鍍銀法《組織、病理、衛生》 : silver impregnation,

毒血症 : tox(a)emia,

毒性 : toxicity, ⇔nontoxicity, vilulence, (of bacteria), (形) toxic, 細胞毒 : cytotoxicity,

毒性 : virulence, (v. of the organism and its toxic secretion), (drug v.), toxicity (toxic

chemical), (toxicity test), 毒性、(病気を引き起こす)筋力: virulence, (形) 毒性のある: virulent, (low-virulent bacteria), 独占的に: exclusively, (canker sores occur e. inside mouth), 毒素: toxin, poisonous substance, ドクターショッピング、医者を渡り歩くこと: doctor shopping, 抗毒素: antitoxin. 特徴、顔だち: feature, (clinical features), 特徴、特性、特質: characteristic, (he has a characteristic of alcoholism), 著しい特徴: prominent feature, 特性を述べる: characterize, (he characterized the earliest dental carieses), 特徴、特質、太鼓判、品位の保障: hallmark, (the h. of healing), 特徴を表す、…を代表する、…の典型となる: typify, (t. each of the classification of injuries), 特徴的な(症状がある疾病に): pathognomonic, (the zygomatic arch is p. of a fracture), (the exudate is considered p.), 特定する、分離する: isolate, (bacteria found in periodontal disease have been isolated in the heart lesion), (場所を) 特定する: place, (p. the implants with 3 to 5 mm space from prepared site to prepared site), 独特の: distinctive, (several d. features characterize cell division), unique, 吐血: hematemesis, 毒血症: toxemia. 特発性: idiopathy, (形) idiopathic, (i. scoliosis), (i. epilepsy), (i. gingival fibrous hyperplasia), (i. odontalgia), (i. disease), (特発性脊椎側弯症: i. scoliosis), 特発性疾患: idiopathy,

溶ける、液化する: liquefy, (it liquefies to a sol upon heating and will regel on cooling), 督脈《経絡》: gorenor vesse meridian, 毒薬: poison, 時計回りの: clockwise, 反時計回りの: countercklockwise, anticlockwise, 棘(とげ)状の: spinous, (s. bone), 徒手の受動(下顎の)、マニピュレーション: manipulation of mandible. 兔唇: hare-lip, cheiloschisis, cleft lip, (unilateral c. l., bilateral c. l., partial c. l., complete c. l.), 重度の両側性兔唇: severe bilateral cleft of the lip, 完全兔唇: complete cleft of the lip, 突縁、突出している縁、フランジ《補綴》: flange, (the lingual surface of the lingual flanges should slope), (denture with overextended labial f.), 突起: process, 突起部: projection, (bony p. or exostosis), (動) protrude, 小突起: spicule, (mandibular ridge has bone spicules), いぼ状の突起で覆われた: verrucous, (a v. or papillated appearance), 骨及び骨腫瘍の一端に出来る丸い突起: boss, 突起、つまみ、取っ手、滑り止めいぼ: lug, (maxillomandibular fixation is achieved by placing elastics or wires to connect the lugs of the maxillary and mandibular arch bars), 特記事項なし(問診時の): past medical history was non-contributory, 特効薬、万能薬: elixir, 突出、前突、突起部、突出症: protrusion, 顎前突: jaw p., 上顎突出: maxillary p., 下顎突出: mandibular p., 側方突出: lateral

<u>p.</u> , 前方突出:forward p., 突起物:突出物、	維の一つ): tonofibrill,
コブ: protuberance, (softtissue p.), 突出部: butress, (buttressing bone formation), (動)突出する: protrude, (the tongue should be protruded), (形) 突出した: protrusive, (p. interocclusal record), stick out, (my front teeth stick out), 突出部、でっぱり (突起、隆起まで及ばないもの): ledge, (bony ledge),	塗布: (名) application, 局所塗布: topical application, (動) apply, (I applied an ointment to the wound), 薬を塗布する用具: applicator, 塗布用抗生物質: topical antibiotics,
突然引き起こす: precipitate, (skin problems are precipitated by the drug),	塗膜、(塗料の) 層:coat, (cement spacer requires two cats for 20 μ of relief and four coats for 40 μ of relief),
突然変異: mutation, (形) mutant, 突然変異誘発力: mutagenicity, 復帰突然変異体: revertant, (病気の) 突発、再燃、: flare-up, (clinical f. u.),	<u>塗抹培養: smear culture,</u>
突発する: outbreak, (hepatitis B outbreaks have been traced to dentists),	留め金: staple, (V-shaped s. form wire), tuck (the membrane was tucked with the bone tuck), 留め金 (トグル) toggle,
特発痛: idiopathic pain,	止める (流血などを): arrest, (measures to a flow of blood),
凸面: convex, (slightly c. profile),	伴う: entail, (excision of large fibroosteoma entails resecting the involved segment of the jaw),
トップダウントリートメント 《インプラント》: top-down treatment,	ドライソケット: dry socket, alveolitis, (a. is also known as dry socket, is a localized inflammatory condition of the alveolar bone that may arise a few days after tooth extraction),
ドップラー超音波検査: Doppler ultrasonography, (the application of the Doppler effect to ultrasonic scanning),	トラウナー及びオップヴェゲザー手術: operation by Trauner and Obwegeser,
整える: (きれいに) 整える: fix, (fix one's hair), groom, 整える、準備する: arrange,	トラウマ, 心の外傷: trauma, mental condition caused by severe shock,
ドナー、献血者、臓器提供者: donor, (the area from which a graft is obtained is called the the d. site), (Block of donor bone is removed), 臓器提供部位: donor site, (intraoral bone donor sites include the tuberosity area, the chin or lateral ramus regions), 提供骨: donor bone, (donor bone is removed), ドナーバー: donor bur,	捉えにくい、分かりにくい: elusive, (e. asymptomatic infection),
トノフィブリル(上皮細胞に見られる微細繊維	ドラッグデリバリーシステム、薬物送達システム: drug delivery system (DDS),
	ドラッグホリデー: drug holiday,
	トラネキサム酸 《薬》: tranexamic acid.
	トラマドール塩酸塩 《薬》: tramadol hydrochloride,

トラモンテ《人名》: Tramonte, S. インプラントにチタン導入歯科医師、(1963 年)、
とらわれてしまうこと: preoccupation, (*p.* with the fear of belief in having a serious disease),
トランキライザー: tranquilizer,
トランジション、変異、転位《生化》: transition,
トランジショナルクラウン、移行クラウン (ある段階からある段階への移行させるためのクラウン) 《補綴》: transitional crown,
トランスファー: transfer, (*t.* of jaw relation record to articulator), ~が可能な: transferable, ~フォーク: *t.* fork. ~コーピング: *t.* coping, ~インデックス: transfer index,
トランスフォーミング成長因子: transforming growth factor (TGF),
トリアムシノロン《生化、薬》: triamcinolon (Tr), (*i.* for articulator),
取扱説明書: instruction,
トリオキシメチレン《生化》: trioxymethylene.
トリガーポイント、発痛点: trigger point,
取り返しの付かない: irreparable, (*i.* tissue damage),
取り囲む: encompass, (craniomandibular disorder *e.* a broad range of patient complaints), circumscribe, (well-circumscribed radiolucent lesions), 取組み、
接近、着手、アプローチ: approach,
(therapeutic *a.* with this disease),
トリガーポイント、引き金点、発痛点: trigger point,
トリカルボン酸サイクル: tricarmonic acid cycle,

トリクロサン: triclosan.
トリクローム染色《組織、病理》: trichrome stain,
トリクロロ酢酸: trichloroacetic acid,
取り込み印象、ピックアップ印象《補綴》: pick-up impression,
トリコモナス《細菌》: tricomonas.
取り揃えた、(用途に応じて) 組み合わせた: assorted, (*a.* burs),
トリチャーコリンズ症候群: Treacher-Collins syndrome,
取り付ける (模型を咬合器などに): mount, place on, (trial dentures are placed on the articulator), 取り付ける、結び付ける、付け加える、添付する: attach, 取り付け部品: attachment element ,
トリパンブルー《組織、病理》: trypan blue.
トリプシン《生化》: trypsin.
トリプトファン《生化学、薬》: tryptphan,
トリポリ《材料、補綴》: tripoli,
トリマー: trimmer,
トリミング: trimming, (knife trimming is done a very sharp knife), (*t.* the margin of the alveolar bone),
取り戻す: regain, (tissue regains its countour and return to a healthy state),
ドリル: drill, (rootcanal *d.*, bone *d.*, twist *d.* pilot *d.*), (most people hate the sound of adentist's *d.*),
トルイジンブルー《組織、病理》: toluidine blue,
ドルーゼ《細菌》: druse,
トルク、回転力: torque, (torque is twisting force), 逆回転力: reverse torque, トルクレンチ《インプラント》: torque wrench, ト

トルクコントローラー 《インプラント》 : torque controller,	(sedative <i>d.</i>), (surgical <i>d.</i>), (periodontal <i>d.</i>),
トルコ鞍 : sella turcica,	トレフィン、トレパン、トレフィン・バー、管のこぎり 《外科、インプラント》 :
トルソー、胴 : torso,	trephine, trepan,
ドルダーバー 《補綴》 : Dolder bar, prosthesis bar, clip-bar, (clip-bar over-denture),	ドレープ : → 覆い布
ドレイン 《外科》 : drain, (<i>d.</i> the abscess), (<i>d.</i> is inserted into the depth of the abscess cavity), ドレインを入れる : drainage, ペンロズドレーン : Penrose <i>d.</i> ,	トレポネーマ 《細菌》 : Treponema, トレポネーマ・パリドム : Treponema pallidum, トレポネーマ・デクチコーラ 《細菌》 : Treponema Denticola (TD 菌), トレポネーマヴィンセンテイ : Treponema Vincenti,
トレー : tray, (impression material is being mixed and loaded into the <i>t.</i>) , (impression material is placed into the <i>t.</i>),	トレポネーマ・パリドム Treponema Pallidum,
印象用トレー : impression tray, 個人〜 : individualized <i>t.</i> , 上顎用トレー : upper <i>t.</i> , 有孔〜 : perforated <i>t.</i> , リムロック〜 : rim-lock <i>t.</i> , 既製トレー、 常備トレー : stock <i>t.</i> , ダイロックトレー : Di-Lock <i>t.</i> , 金属トレー : metal <i>t.</i> , プラスチックトレー : acrylic <i>t.</i> , 局部トレー : sectional <i>t.</i> , 水冷式トレー : water-coolic <i>t.</i> , トップレストレー : topless <i>t.</i> , オープントレー : open <i>t.</i> , topless <i>t.</i> , クローズド トレー : closed <i>t.</i> , トレーの選択 : selection of tray, トレーの口腔内挿入 : incertion of impression <i>t.</i> into the mouth. Seat the tray in place. Carry the tray to the mouth, 手用器具を置く トレー : instrument <i>t.</i> ,	トレンデレンブルグ体位 《救急》 : Trendelenburg's position
トレースする、(図などを写し取る) : trace.	ドロウ (インレーなどの末広がり型) : draw, (a path of <i>d.</i> allows insertion),
トレーサー : tracer,	トロールカル 《外科》 : trocar, (<i>t.</i> to make portholes via a small stab in the preauricular region),
トレーコンパウンド : tray compound,	トロローサ・ハント症候群 : Tolosa-Hunt Syndrome,
トレオニン 《生化》 : threonine,	トローチ : troche,
トレーチャー・コリンズ症候群 : Treacher Collins syndrome,	とろみ : thick, とろみをつける : to have thick, (とろみの付いたスープ : thicken soup),
ドレッシング、被覆包帯 《歯周》 : dressing,	トロンビン 《生化》 : thrombin,
	トロンボテスト、オーレンテスト 《検査》 : thrombo test, Owren test,
	トロンボプラスチン 《生化, 生理》 : thromboplastin,
	鈍角 : obtuse angle,
	鈍感な : insensitive,
	鈍器 : blunt instrument,
	貪食細胞 ; phagocyte, phagocytic cell, 貪食作用 : phagocytosis,

鈍的外傷 : blunt trauma, 鈍的切開 : blunt dissection, (*b. d.* with a hemostat into the abscess cavity),

トンネル形成《歯周、外科》 : tunnel preparation, トンネル法 : tunneling technique,

鈍麻する、感受性を減らす : desensitize, 鈍麻、鈍感にさせること : desensitization, (歯牙)

鈍麻剤 : desensitizing agent,

遁路、スピルウエー《補綴》 : spill way, sluiceway, (*s.* for food),